

---

# LA LLAVEIA DORSALIS, NOBIS.

POR


EL SR. DR. ALFREDO DUGÈS,

SOCIO CORRESPONSAL.



En el mes de Noviembre de 1887, recibí por conducto de mi hermano el Dr. Eugenio Dugès, unos *ajes* que le entregó el Sr. Garcidueñas, farmacéutico de Pénjamo (Estado de Guanajuato): á este señor se los trajeron de las cercanías diciéndole que se encontraban sobre el *tepame*, probablemente una mimosea. Dicen los indios colectores que el macho es tan grande como la hembra, y provisto de alas, aserción seguramente errónea.

Esta especie ó variedad de aje no difiere en nada de la *Llaveia axinus*, en cuanto á sus caracteres genéricos, y yo no hubiera pensado en darla á conocer si no hubiera encontrado en todos los ejemplares sin excepción, una coloración característica que á primera vista da la idea de una especie diferente: sea lo que fuere de esta opinión, he aquí la descripción de la hembra, la única que cosechan.


Dimensiones de los individuos más grandes: longitud, 0<sup>m</sup>0165; anchura, 0<sup>m</sup>010: los más chicos tienen de largo, 0<sup>m</sup>007, y de ancho, 0<sup>m</sup>004; hay otros intermedios. Al verlos vivos y cubiertos con su secreción, ó á lo menos algo de ella, el color del dorso es aplomado como el de las cochinitas (*Porcellio mexicanus*) y las partes rojas son algo opacadas. Mojados con alcohol se ven estos animales de un rojo muy brillante: á



RHINOPHYRNUM DORSALIS, Dum. et Bibr.



LLAVEIA DORSALIS, A. Dugès.



Metamorfosis de la Chapuisia mexicana, E. Dugès.



lo largo de la parte superior se extiende una línea de puntos rojos desde la cabeza hasta los últimos dos anillos; este color resalta tanto más cuanto que las porciones oscuras son entonces de un negro rojizo bastante subido. Las partes encarnadas son: la cabeza, los últimos dos anillos y todo el contorno, siendo este último interrumpido por una mancha oscura en cada segmento.

Por debajo, uno que otro de estos ajes es de un rojo uniforme, pero casi todos tienen las manchas negro-rojizo siguientes: á los lados de la cabeza y de las divisiones torácicas; en el borde externo de cada segmento abdominal, menos en los dos últimos; en el borde externo de la parte media del abdomen.

Las antenas y patas son negras; estas últimas me han parecido más cortas que las de la *Llaveia axinus*. El nacimiento del rostro es negro también.

Estos ajes se emplean como los de la especie típica.

En el caso que se llegue á descubrir transiciones entre las dos formas, la actual conservaría el nombre trinomial de *Llaveia axinus dorsalis*.

Guanajuato, Noviembre de 1887.

LÁMINA XV.—A, visto por encima.—B, id. por debajo.

---