



EUMECES ROVIROSAE, A. DUG.

(LÁMINA XIII).

**POR EL MISMO SEÑOR SOCIO.**

Este pequeño Escincoideo me fué remitido por mi buen amigo el Sr. José N. Roviroza, bien conocido ya por los lectores de «La Naturaleza,» á quien lo dedico como muestra de gratitud por los interesantes reptiles que ha tenido la bondad de enviarme de Tabasco.

Desgraciadamente este ejemplar, que proviene del Mineral de Santa Fe, Chiapas, fué dado al Sr. Roviroza muy maltratado del vientre, cuello y ano; pero me permitió, sin embargo, hacer un estudio bastante exacto para poderlo describir.

Dimensiones: cabeza y cuerpo, 0,<sup>m</sup>026; cola, 0,<sup>m</sup>045; miembro anterior, 0,<sup>m</sup>01; miembro posterior, 0,<sup>m</sup>014.

No hay dientes en el paladar: la lengua, bastante desmejorada, parece ligeramente escotada en la punta: el párpado inferior y el superior están protegidos por escamas delgadas: las escamas medianas de debajo de la cola son un poco más grandes que las otras: he contado unas quince escamas dorsales de una línea amarilla á la opuesta, pero de las ventrales, totalmente destruidas, no pude ni aproximadamente calcular su número: de la nuca hasta la base de la cola las escamitas llegan á cosa de cuarenta poco más ó menos. La placa frontal tiene la misma forma que en los *Mabuya*: si no es esta una particularidad meramente individual, podrá servir como un buen carácter específico. Inútil sería detallar aquí todos los demás caracteres morfológicos, pues bastan las láminas para conocerlos.

El *Eumeces Rovirozæ* tiene la garganta amarillenta, y las partes inferiores del cuerpo y de las patas, gris azulado. La cola es azul: las partes superiores son todas de un café negruzco; los miembros de este mismo color sin manchas ni rayas. Cinco líneas amarillas muy marcadas recorren el cuerpo: las tres de en medio alcanzan hasta uno y medio centímetros sobre la base de la cola, y las laterales terminan en la ingle: la mediana se divide en dos al tocar el ángulo posterior de la frontal, y sus dos ramas van hasta la rostral, que es de un color pálido: las dos líneas dorso-laterales comienzan en medio de las ramas de división ya indicadas, pasan sobre el borde externo de las palpebrales y después acompañan á la mediana: las líneas laterales ocupan el labio superior, continúan detrás de la oreja, pasan encima del miembro anterior y caminan después hasta la ingle: estas últimas rayas tienen inferiormente un ribete pardo que las separa del apizarrado del vientre.

Este Saurio, á primera vista, parece tener los colores del *Eumeces fasciatus*, joven; pero en este último la bifurcación de la línea medio dorsal comienza sobre el occipucio, al nivel de las orejas, y la cola es bicolora. El *Eumeces Rovirozæ* es más parecido al *E. lynxæ*; pero la línea medio dorsal de éste no pasa más allá de los hombros, y además se ve á lo largo del flanco una faja negra muy bien marcada y cuyo color es, de consiguiente, distinto del correspondiente al dorso, que es castaño pardusco.

La especie actual me parece, por lo mismo, buena; pues no la encuentro descrita en ninguno de los autores que poseo.

Guanajuato, Mayo 7 de 1893.

#### EXPLICACIÓN DE LAS FIGURAS.

1. *Eum. Rov.*, tamaño natural.—2, 3, 4, 5. Cabeza y parte inferior de la cola aumentada dos veces.—
6. Párpados cerrados: *a*, superior; *b*, inferior.—7. Nariz.

