

BOA IMPERATOR, DAUD.

(LÁMINA XIII).

POR EL MISMO SEÑOR SOCIO.

Los caracteres que se asignan á las diferentes formas de Boas para considerarlas como especies distintas, entre las cuales las mejores definidas serían, según E. D. Cope (Catal. Batr. and Rept. Centr. Am. and Mco., 1887, pág. 95), *Boa constrictor*, *B. imperator* y *B. diviniiloquax*, son bastante variables y de importancia secundaria á mi modo de ver, y susceptibles de dar lugar cuando más al establecimiento de subespecies con sus variedades: en este punto estoy completamente de acuerdo con mi amigo Bocourt (Miss. Sci. Mex.), que cree que no hay más que una sola especie de Boa con razas locales. No siendo el objeto de esta nota discutir esta cuestión, sino simplemente dar á conocer una forma especial, paso á la descripción de unos individuos capturados en Motzorongo, á 42 kilómetros Sur de Córdoba.

He examinado seis de ambos sexos, y á todos les he encontrado los mismos caracteres, muy aparentes á primera vista. En el tronco se cuentan sesenta y cinco series de escamas: debajo del círculo orbitario (véase la fig. 2) existe una fila de dos ó tres escamas que lo separan de las labiales superiores: estas últimas son en número de diez y nueve á veinte. Las medidas tomadas de uno de los mayores ejemplares son las siguientes:

Cabeza: largo, 0,^m07; ancho, 0,^m045.
 Tronco: largo, 1,^m58; circunferencia, 0,^m21.
 Cola: largo, 0,^m17.

Total: 1,^m82.

El color general es de un ferruginoso tirando á amarillo, más deslavado en los flancos y con un matiz tierra de siena quemada en la cabeza; los labios, garganta y vientre son blancos ó de un color pajizo: la cola tira á amarillo por debajo. Sobre el tronco se ostentan veintidós hermosas manchas de la forma ordinaria en las Boas centro-americanas: encima de la base de la cola hay otra romboidal, rojo oscuro rodeado de negro, y otras cinco ovaladas y del mismo color sobre la cola. Inútil es describir más detalladamente el resto de la maculatura, que se puede leer en varias obras, y sobre todo en la parte de reptiles de la Miss. Sci. Mex. por Bocourt.


Las particularidades constantes, y por ende notables que presentan los seis individuos de que hablo, son las siguientes (véase la fig. 1). Encima de la cabeza no se observa la raya negruzca que forma una cruz entre los ojos: la región frenal, aunque algo más oscura que el vértice, no presenta ninguna mancha: sobre la rostral y debajo del ojo solo algunos individuos tienen un indicio de manchita negra. De manera que, salvo la faja que corre desde el ojo hasta la comisura de la boca, la cabeza carece por completo del dibujo usual, visible en todas las Boas que he tenido entre las manos.

Aunque solamente como raza localizada en Motzorongo, puede servir la actual para demostrar una vez más lo variable que son los caracteres asignados á las Boas mexicanas, y por consiguiente, autorizar la reunión de todas ellas en una sola especie.


Guanajuato, Mayo de 1893.



Coleonyx elegans, Gray.



Eumeces Rovirosae, Alf. Dug.



Boa imperator, Daud.