

# UNA APRECIACION ACERCA DEL GENERO ABASOLOA DE LA LLAVE Y LEJARZA

En el núm. 12 del Boletín del Herbario Boissier, 2ª Serie, 1902, se publicó un artículo subscrito por el Sr. Federico N. Williams, en que declara como insubsistente el género *Abasoloa*, fundado por La Llave y Lejarza, en una especie desconocida de la familia de las Compuestas. Dice el articulista, que no teniendo á la mano los ejemplares auténticos de que se sirvieron los expresados autores, tuvo que seguir otro camino en su investigación. El que le pareció más obvio, fué el de comparar la descripción original con los géneros afines existentes en las colecciones de Kew y del Museo de Historia Natural. Que la identificación que buscaba, la creyó encontrar, tanto en una planta colectada en 1891 por Pringle en las montañas, cerca de Pátzcuaro (Michoacán), como en otra, colectada también por aquél, en la sierra de San Felipe (Oaxaca), á 3000<sup>m</sup> de altura. Ahora bien: según B. L. Robinson, ambos ejemplares pertenecen á la misma especie, fundada por este autor en el primero de ellos, bajo el nombre de *Sabazia Michoacana*. Sin entrar en más pormenores, diré, que el expresado Sr. Williams supone, en definitiva, que si existen diferencias, aunque pequeñas, entre los caracteres de los géneros *Abasoloa* y *Sabazia*, depende de que la descripción del primero se hizo probablemente con ejemplares más ó menos alterados por la desecación. Por último, no teniendo en cuenta los caracteres genéricos, sino tan sólo los específicos, expone el Sr. Williams en los términos siguientes su descripción.

ABASOLOA TABOADA, Llav. et Lex.); SABAZIA MICHOCANA, Rob.

*Herba perennis, 6-9 dm. Caulis gracilis purpurascens hirsutus dichotome perrimosus, rhizomote brevi transverse edens. Folia lanceolato-ovata serrata, serraturis paucis, apice acuta, basi obtusiuscula trinervia supra pubescentia, subtus canescenti-tomentosa, petiolis brevibus pubescentibus. Calathia numerosa, laxa cymosa minuscula basi truncata, radio expanso 6-8 mm. diam., longè pedunculata; pedunculi pilosi subcalathio hirsuto, bracteolati, bracteolis lanceolatis exiguis. Periclinii squamæ 12-16, ovatae-acutæ, interiores paulum longiores angustiores oblongiores et magis acutæ sed vix acuminatæ. Ligulæ elliptico-lingulatæ, albidæ vel pallide roseæ, tubo hirsuto. Flosculi disci lutescenti-albidi, limbo 4-5 dentato, tubo parce hirsutello. Antheræ basi integræ. Styli apicibus breviter obtuseque appendiculatis. Cypselæ parvæ, nigrae, oblanceolatæ, hispidulæ. Pappus nullus.*

México, Marzo de 1903.

M. M. Villada.