

## CORYNORHINUS MACROTIS

RAZA: PALLESCENS, GERR. S. MILLER JR. NORTH AMER FAUNA N.º 13 (1897).

Gerrit S. Miller, jr., dice haber examinado 17 individuos de esta raza, recibidos de Santa Rosa, Guanajuato. Ignoro quién puede haber mandado á los Estados Unidos del Norte semejante colección de murciélagos; por lo que á mí toca, no he enviado ninguno y no he visto más que dos ejemplares que hallé en un locero de la Presa de la Olla.

F. C. Allen indica para el *Corynorhinus macrotis* la siguiente fórmula dentosia: premolares  $\frac{3}{2}$ , molares  $\frac{3}{3}$ . Mi notación es igual á la que da Miller: I.  $\frac{2-2}{3-3}$ ; C.  $\frac{1-1}{1-1}$ ; M.  $\frac{5-5}{6-6}$ =36. Según el mismo Miller los incisivos superiores pueden ser bienpidados ó no.

En lo general, el COR. MACR. PALLESCENS, parece no diferir del COR. MACROTIS típico, más que en su coloración, que es mucho más pálida.

Longitud, 0<sup>m</sup>,05.—Extensión de las alas, 0<sup>m</sup>,28. Se observa una glandulita redonda debajo de la mandíbula inferior, y otra debajo de cada ojo, en el ángulo de los labios. El *tragus*, en forma de lezna, un poco ensanchado en su base hacia afuera, mide un tercio de la longitud de la oreja, que es enorme, pues llega á dos centímetros y medio. Las dos gruesas prominencias de la cara se juntan en medio; entre ellas y los abultados labios se observa un espacio pentagonal, en donde están colocadas las narices subtriangulares.

Las regiones superiores del cuerpo son de un color pardo, bastante claro, y tirando á bayo; las inferiores tienen un tinte más amarillento, mezclado de gris. Cara parda, con la mandíbula inferior más clara. Orejas pardas, pero con un matiz rosado. Patas pardas, con las uñas amarillo de cuerno. Alas pardas; los dedos como blanquecinos en la cara inferior. Membrana interfemoral, más clara que las alas. Pelo lanoso y suave.

En la adjunta figura que hice en vista de un individuo vivo, se puede ver que las orejas están replegadas sobre los hombros, dejando libres los *tragus* erguidos: esta posición de las orejas se nota cuando el animal duerme ó cuando lo asustan; algo como los perros que tienen miedo.

El grito de Corinorino es una especie de estridor parecido al ruido que hace el cuero nuevo al plegarlo.

---

No tengo datos sobre su modo de vivir, pero su dentición es francamente insectívora, y no es probable que sea nocivo para los vertebrados.

Lo describo para que se pueda identificar si lo encuentran en alguna otra parte de México, y sobre todo, para dar á conocer su singular actitud cuando se cuelga para dormir, con sus patas afianzadas en la roca.

#### EXPLICACIÓN DE LAS FIGURAS:

1, *C. mac.* en posición de dormir.—2, Cabeza vista de frente.—3, Contorno del hocico aumentado al doble.—4, Cráneo de esta magnitud.

---