
MOLLUSCA.

Catalogus Molluscarum Maxicanæ Reipublicæ hucusque descripta.

MOLLUSCA.—Etimología: En latín, *mollusca* es una ave cuya corteza es muy tierna; de *mollis* blando. Se aplica esta voz á un grupo de animales que tienen el cuerpo blando y carecen de esqueleto sólido como los vertebrados: la concha ó caracol de los moluscos es un órgano secundario y solo de protección. La palabra *Mollusco* fue empleada primero por Aristóteles, pero dando el nombre de *Ostracodermos* (*Οστρακον*, concha; *λέρνα*, piel) á los que realmente tienen una cubierta caliza. Blainville propuso el nombre de *Malacozoarios* (*μαλακός*, blando; *ζῷον*, animal) para designar la clase de animales que hoy se llaman sencillamente *moluscos*.

CEPHALOPODA DIBRANCHIATA.

Etimología: Cefalopodos, del griego *κεαφλή*, cabeza, *πούς*, *ποδός*, pie. Dibranquios, griego *δις*, dos, (*δι*) *βράγχια*, branquias, agallas. Animales que tienen pies, brazos ó tentáculos en la cabeza y con dos branquias.

OCTOPODA.

Etimología: Griego *οκτώ*, ocho, *ποντίς*, *ποδός*, pie, (brazo, tentáculo) animal que tiene ocho tentáculos ó brazos.

OCTOPODIDÆ.

Género *Octopus*, Lamark, 1799.

Octopus vulgaris, Lamark.

Nombre común: Pulpo común. (Aristóteles lo llamó *πολύποντος*, pólipo.)

Sinonimia: *Polypus americanus pelagiensis*, Linn.

Habitat: Veracruz.

ARGONAUTIDÆ.

Etimología: Griego, *Ἀργοναυτῆς*, el que navega en el buque Argos. *Ἀργός* Argos; *ναυτής*, el que navega.

Gén. *Argonauta*, Linn., 1756.

Argonauta argo, var. *pacifica*, Dall.

N. común: *Argonauta argo*, del Pacífico.

Hab.: Tepic (Isla de Trináculos).

Argonauta argo, Linn.

Nombre común: Argonauta argos.

Hab.: Veracruz.

Argonauta expansa, Dall.

N. etimológico: Argonauta desplegado. Latín: *expando*, desplegar.

Hab.: Tepic.

DECAPODA.

Etim.: *Δεκαδά*, diez; *πούς*, *ποδός*, pie, con diez brazos ó tentáculos.

LOLIGINIDÆ.

Etim.: Latín, *loligo*, *inis*, el calamar, del cual habla Plinio.

Gén. *Loligo*, Lamark, 1801.

Loligo subulata, Lamark.

N. común: Calamar aleznado. Latín: *subula*, la lezna.

Hab.: —

GASTROPODA.

Etim: *Γαστηρ*, *γαστρός*, estómago, vientre, *πούς ποδός*, pie, tentáculo, brazo.

El Dr. Fischer divide la clase de los Gasterópodos en dos subclases: *Univalvia* y *Multivalvia*. La primera comprende cuatro órdenes: Pulmonata, Opistobranchiata. Nucleobranchiata y Prosobranchiata. La segunda solo tiene un orden Polyplacophora.

PULMONATA.

Etim.: Como su nombre lo indica comprende aquellos moluscos que tienen una respiración pulmonar.

TESTACELLIDÆ.

Etim.: De *testacella* y la desinencia *idae*. Testacella es el diminutivo del latín *testaceus*, que está formado de tejas, de *testa*, teja, *concha*. La *testaceología* es la parte de la Historia Natural que se ocupa de los moluscos testaceos.

Gén. *Strebelia*, Crosse et Fischer, 1868.

Strebelia berendti, Pfeiffer.

Sinonimia: *Physella berendti*, C. et F.

Habitat: Cosecomatepec.—Mirador, V. C.—Pachoch, cerca de Jalapa.—(M. S. M. I., p. 11. B. C. A., p. 46.)

NOTA:—Según Brochi es una de las especies geofílas más notables de la República Mexicana. En la B. C. A., este género forma parte de la Familia *Agnatha*, suborden *Stylomatophora*, (Gasterópodos pulmonados monoicos.) Pertenece también á la fam: *Agnatha*, los géneros *Glandina*, *Salaciela* y *Strebostyla*.

Gén.: *Strebostyla*, Schuttleworth, 1851.

Etim.: *Στρεπτός*, contorneado, entrelazado ó toreado; *στύλος*, columna, *espira*. Espira muy retorcida.

Formula dentaria:

$$(30-20-0-20-30) \times 90 = 9000.$$

Los dientes laterales son alargados, estrechos, algo arqueados, unicuspides, llamados por Fischer *dientes carníceros*, semejantes á los dientes marginales de los Janites, que son dientes herbívoros ó molares. Los Estreptostila se distinguen de los Glaudina por la ausencia de dientes raquiales.

Strebostyla nicoleti, Schuttleworth.

Sinonimia: *Spiraxis nicoletis*, Schutt.; *Achatina nicoleti*, Schutt.; *Strebostyla nicoleti*, var. *subovata*, F. et C. (a)

Habitat: Misantla, San Isidro, San Juan Miatlán, Coatepec, Jalapa, Córdoba. (a) Toxopam, cerca de Córdoba, Orizaba. M. S. M., p. 23; B. C. A., p. 85.

Strebostyla botteriana, C. et F.

Habitat: E. Méx., Orizaba. B. C. A., p. 85; M. S. M., p. 25.

Strebostyla dubia, Pfr.

Etim.: Estreptostila dudosa. Latín *dubius*, dudoso.

Habitat: Chiapas. B. C. A., p. 90; M. S. M., p. 65.

Strebostyla nigricans, F. et C.

Etim.: Estreptostila negrilla. Latín *nigricans*, lo que tira á negro.

Sinonimia: *Glandina nigricans*, Pfr.; *Achatina nigricans*, Pfr.; *Spiraxis nigricans*, Pfr.

Hab.: Var. B: Tabasco (col. Cunning). B. C. A., p. 90; M. S. M., p. 60.

Streptostyla mitraeformis, Schuttleworth. Etim.: Estreptostila en forma de mitra.

Sinonimia: Spiraxis mitraeformis, Pfr.; Chersomitra mitraeformis, Albers.

Hab.: Túxpam, Córdoba. B. C. A., p. 90; M. S. M., p. 62.

Esta especie sólo se ha encontrado en México. (Martens, 1878).

Streptostyla delattrei, Pfr.

Sin.: Streptostyla delattrei, var. edwardsiana; Streptostyla delattrei, var. sallaei; Streptostyla sallaei, F. et C.

Hab.: E. Méx., Orizaba, Mirador. B. C. A., p. 91-92; M. S. M., p. 35-36.

Streptostyla irrigua, F. et C.

Etim.: Estreptostila regadera. Latín *irriguus*, lo que sirve para regar.

Sin.: Spiraxis irrigua; Streptostyla irrigua, var. cingulata. (Estreptostila regadera con fajas. Latín *cingulus*, faja).

Hab.: Córdoba, Tuxtla. B. C. A., p. 92; M. S. M., p. 40.

Streptostyla schuttleworthi, Pfr. (1)

Sin.: Spiraxis schuttleworthi; Streptostyla schuttleworthi, var. ventricosa (2); Streptostyla schuttleworthi, var. similis (3); Streptostyla schuttleworthi, var. quirozi (4); Streptostyla brevispira, Streb; Spiraxis bullacea, Pfr.

Hab.: Misantla (1, 3, 4), Córdoba (1), Orizaba (1, 2, 3), Chiapas (1), Tabasco (1), Juquila (3), Teziutlán (4), Coatepec (4), Miahuatlán (4), Veracruz (3), San Antonio del Monte (4). B. C. A., p. 92; M. S. M., p. 41.

Streptostyla novoleonis, Pilshy.

Hab.: Diente, cerca de Monterrey, N. L.—B. C. A., p. 92.

Streptostyla cylindracea (Pfr.), F. et C.

Sin.: Achatina cylindracea, Pfr.; Spiraxis cylindracea, Pfr.

Hab.: Córdoba. B. C. A., p. 93; M. S. M., p. 30.

Streptostyla coniformis, Schuttleworth.

Etim.: Estreptostila en forma de cono.

Sin.: Spiraxis coniformis, Schutt.; Streptostila blandiana, F. et C.; Streptostyla coniformis, var. pfeifferi, F. et C. (a); Achatina streptostyla, Pfr.; Glandina streptostyla, Pfr.

Hab.: Córdoba, Mirador, Coatepec, Orizaba, (a) México, sin indicación precisa. B. C. A., p. 94; M. S. M., p. 43.

Streptostyla conulus, sp. n. Martens.

Hab.: Sayula. B. C. A., p. 94.

Streptostyla turgidula, Pfr.

Etim.: Estreptostila hinchadita. Latín *turgidus*, hinchado.

Sin.: Spiraxis turgidula, Pfr.

Hab.: Córdoba, Jalapa. B. C. A., p. 95; M. S. M., p. 58.

Streptostyla lurida, Schuttleworth.

Etim.: Estreptostila pálida. Latín *luridus*, pálido en demasía.

Sin.: Spiraxis lurida, Schutt.; Streptostyla boecourti, C. et F.; Streptostyla boecourti, var. γ (major) (a), F. et C.

Hab.: Córdoba, Pacho, Orizaba, San Juan Bautista, (a) Chiapas. B. C. A., p. 96; M. S. M., p. 48.

Streptostyla nebulosa, Dall.

Hab.: San Cristóbal (Chiapas). B. C. A., p. 615.

Streptostyla ventricosula, H. & A. Adams.

N. etim.: Estreptostila ventrudita. Lat. *ventricosa*, ventruda.

Sin.: Spiraxis ventricosula, Morelet; Glandina ventricosula, Morelet.

Hab.: Yucatán, Mérida (juntamente con la Estreptostila meridana). B. C. A., p. 97; M. S. M., p. 30.

Streptostyla plicatula, Streb.

Etim.: Estreptostila plegadita. Lat. *plicatus*, plegado.

Hab.: Orizaba. B. C. A., p. 98.

Streptostyla biconica, Pfr.

Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 98; M. S. M., p. 32.

Streptostyla flavescens, Schuttleworth.

Etim.: Estreptostila rubia. Lat. *flavescere*, ponerse rojo, rubio.

Sin.: Spiraxis flavescens; Streptostyla flavescens, var. boecourti (a); Spiraxis boecourti, Pfr.

Hab.: Córdoba, (a) Juquila. B. C. A., p. 98; M. S. M., p. 37.

Streptostyla fulvida, C. et F.

Etim.: Estreptostila leonada. Lat. *fulvus*, leonado, rojo.

Hab.: Orizaba. B. C. A., p. 99; M. S. M., p. 49.

Streptostyla glandiformis, C. et F.

Etim.: Estreptostila forma de bellota. Lat. *glans*, bellota.

Hab.: Orizaba. B. C. A., p. 99; M. S. M., p. 50.

Streptostyla physodes, Schutt.

Etim.: Estreptostila burbuja. Griego: $\varphi\nu\sigma\alpha$ vejiga, burbuja; $\varepsilon\bar{\iota}\delta\sigma\varsigma$ forma. (Debería decirse *physoides*).

Sin.: Achatina physodes, Schutt.; Spiraxis physodes, Schutt.; Streptostyla physodes, var. major; Spiraxis auriculacea, Pfr.; Streptostyla auriculacea, F. et C.

Hab.: Córdoba, Coatepec, Mirador, Huatusco,

Chiapas, var. *B*; Orizaba, Atoyac, var. major. B. C. A., p. 99; M. S. M., p. 54.

Streptostyla limnaeiformis, Schutt.

Etim.: Estreptostila semejante á una limnaea.

Sin.: *Spiraxis limnaeiformis*, Schutt.; var. *parvula*; *Spiraxis parvula*, Pfr. (a); *Streptostyla parvula*, Pfr.

Hab.: Córdoba, (a) Chiapas. B. C. A., p. 100; M. S. M., p. 38.

Streptostyla oblonga, Pfr., F. et C.

Sin.: *Spiraxis oblonga*, Pfr.

Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 100; M. S. M., p. 57.

Streptostyla meridana, Morelet.

Sin.: *Glandina meridana*, Morelet; *Spiraxis meridana*, Pfr.

Hab.: Yucatán. B. C. A., p. 101; M. S. M., p. 32.

Streptostyla vexans, Streb.

Etim.: Estreptostila infestante. Lat. *vexo*, infestar.

Hab.: Jalapa. B. C. A., p. 102.

Streptostyla boyeriana, C. et F.

Hab.: Orizaba. B. C. A., p. 102; M. S. M., p. 46.

Streptostyla mohriana, Pfr.

Sin.: *Spiraxis mohriana*, Pfr.

Hab.: Orizaba, cerro del Borrego. B. C. A., p. 102; M. S. M., p. 64.

Streptostyla catenata, Pfr.

Etim.: Estreptostila con mallas ó cadenas. Lat. *catenatus*, con cadena.

Sin.: *Spiraxis catenata*, Pfr.

Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 103; M. S. M., p. 63.

Streptostyla blandiana, C. et F.

Hab.: Córdoba. M. S. M., p. 28.

Streptostyla boucardi, Pfr.

Hab.: Juquila, Oax. M. S. M., p. 43.

Streptostyla bocourtii, C. et F.

Hab.: Var. *B*, México; var. *γ*, Chiapas. M. S. M., p. 47.

Streptostyla auriculacea, Pfr.

Etim.: Estreptostila orejuda. Lat. *auricula*, oreja.

Sin.: *Spiraxis auriculacea*, Pfr.

Hab.: Córdoba. M. S. M., p. 55.

Streptostyla bullacea, Pfr.

Etim.: Estreptostila ampollada. Lat. *bulla*, amolla, burbuja.

Hab.: Chiapas. M. S. M., p. 56.

Streptostyla edwardsiana, C. et F. (Véase *S. delattrei*).

Hab.: Cerca de Orizaba. M. S. M., p. 35.

Nota.—En la Mission Scientifique au Mexique se advierte que esta especie es diferente de la *S. delattrei* y de la *S. sallei*, aunque ya la habíamos anotado como una variedad de la primera. La *S. sallei* es la especie más grande que se encuentra en el género.

Subgénero *Petenia*.

Etim.: Petenia, de Peten, ciudad de Guatemala en donde se encontró por primera vez.

Petenia ligulata, Morelet, 1868.

Sin.: *Streptostyla ligulata*, Pfr.; *Glandina ligulata*, Morelet; *Achatina ligulata*, Pfr.; *Spiraxis (Glandina) ligulata*, Pfr.

Etim.: Petenia acordonada. Lat. *ligula*, cordón, liga, haciendo alusión á la faja que la distingue.

Hab.: Córdoba; Palenque, Tab.; Motzorongo. M. S. M., p. 68.

Gén. *Glandina*, Schumacher, 1817.

Etim.: Glandina, sinónimo de Achatina. Del latín *glans*, *glandis*, bellota (*glandina*); *ina* es una desinencia que expresa forma ó semejanza.

Glandina sowerbyana, Pfr.

Fórmula dentaria: $(30-1-30) \times 45 = 2745$.

Sinonimia: *Glandina lignaria*, Reeve; *Achatina (G.) sowerbyana*, Pfr.; *Oleacina sowerbyana*, Pfr.—Variedad: *Glandina sowerbyana*, var. *stefaniae* (a).

Habitat: E. Méx., Misantla, San José, San Juan Miahuatlán, Pacho, Mirador, cerro Necoxtla, entre Jalapa y Orizaba; Orizaba; SO. y O. Méx.; Omilteme, Gro.; Totontepec, Oax.; (a) E. Méx.; Miahuatlán. B. C. A., pp. 55 y 56; M. S. M., pp. 97 y 98.

Glandina indusiata, Pfr.

N. etim.: Glandina vestida. Latín *indusiatus*, vestido con camisa, de *indusium*, camisa, apuleyo.

Sinon.: *Oleacina indusiata*, Pfr.; *Glandina truncata*, Streb.*

Hab.: C. Méx.; Angangueo, Mich.; S. Méx.; La Parada, Oax. B. C. A., p. 54; M. S. M., p. 121.

Glandina vanuxemi, Lea.

Etim.: Glandina de Vanuxem.

Sinon.: *Achatina vanuxemensis*, Lea.; *Oleacina vanuxemensis*, Lea.; *Achatina coronata*, Pfr.; *Glandina coronata*, Pfr.; *Oleacina coronata*, Pfr.; *Glandina vanuxemi*, variedad *guttata*, F. et C. (a).

Etim.: Glandina de Vanuxem manchada. Lat. *guttatus*, manchado.

* Fórmula dentaria: $(32-1-32) \times 65 = 4225$.

- Sinon.: *Oleacina guttata*, F. et C.
Hab.: C. Méx.: Volcán de Mexicalcingo, Cuernavaca, Tehuacán; SO. y S. Méx.: Omilteme (Guerrero); Oaxaca, Juquila (Oax.); C. Méx.: (a) cercanías de Puebla (rara). B. C. A., pp. 54 y 55; M. S. M., pp. 100-101.
- Nota*.—Es incorrecto escribir *vanuxemensis* para designar esta especie; debe ser *vanuxemi*.
- Glandina coulteri**, Martens.
Sin.: *Oleacina coulteri*, Gray.; *Glandina uhdeana*, F. et C.; *Oleacina uhdeana*, Pfr.
Hab.: C. Méx.: Zimapán, Puebla; E. Méx.: Jalapa (V. C.). B. C. A., p. 56; M. S. M., p. 94.
- Glandina cuneus**, Mart.
Etim.: Glandina cuña. Latín *cuneus*, cuña.
Hab.: SO. Méx.: Omilteme, Gro. B. C. A., p. 56.
- Glandina michoacanensis**, Mart.
Hab.: Uruápm (Mich.). B. C. A., p. 610.
- Glandina ghiesbreghti**, Pfr.
Sin.: *Achatina ghiesbreghti*, Pfr.; *Oleacina ghiesbreghti*.
Hab.: Chiapas; SE. Méx.: San Juan Bautista (Tab.). B. C. A., p. 58; M. S. M., p. 106.
- Glandina tenella**, Streb.
Etim.: Glandina pequeñita. Lat. *tenellus*, pequeño.
Sin.: *Glandina ghiesbreghti*, var. *B*, F. et C.
Hab.: Veracruz.
- Glandina cunningi**, Mart.
Sin.: *Glandina petiti*, Deshayes.
a. *Glandina cunningi*, var. *fulvo-rosea*.
Achatina rosea, Ferussac.
Glandina rosea, Pfr.
b. *Glandina cunningi*, var. *flavida*.
Achatina petiti, Deshayes.
Oleacina petiti, Gray.
c. *Glandina cunningi*, var. *rubro-marginata*.
Achatina rosea, var. *γ*, Pfr.
Hab.: SE. Méx.: Teapa (Tab.); México
B. C. A., p. 59; M. S. M., p. 107.
- Glandina carmenensis**, Morelet. (*Glandina* de la Isla del Carmen).
Sinon.: *Achatina carmenensis*, Desh.; *Oleacina carmenensis*, Gray.; *Achatina rosea*, var. *B*, Reeve.
Hab.: Isla del Carmen, Yuc.; Bahía de Términos, Golfo de Campeche. M. S. M., p. 109; B. C. A., p. 69.
- Glandina liebmani**, Pfr.
Sin.: *Achatina liebmani*, Pfr.; *Oleacina liebmani*, Pfr.; *Achatina striata*, Reeve.
Glandina liebmani, var. *insignis* (a).
Achatina insignis, Pfr.
- Oleacina insignis*, Pfr.
Glandina insignis, F. et C.
Hab.: México, alrededores; SO. Méx.: Colima; Chilpancingo, Gro.; (a) SO. Méx.: San Blas (Jal.), Tepic. B. C. A., pp. 61-62; M. S. M., pp. 110-119.
- Glandina audebardi**, Desh.
Sin.: *Oleacina audebardi*, Pfr.; *Helix rosea*, var. *elongata*, Fér.; *Glandina amaña*, Martens.
Glandina audebardi, var. *a*, *typica*, (a).
» » » *b, amaña*, (b).
» » » *c, miradoroensis*, (c).
» » » *e, minor*, (d).
- Habitat: Llanos de Veracruz, *a* y *b*; Chichiquihuitl (a), Ver.; Veracruz, Jalapa, Córdoba (b); Mirador (c); Tejería, ciudad de México; Chietla, Puebla (a); Venta de Zopilote, Gro. (a); Tehuantepec (d); Colima. B. C. A., p. 62; M. S. M., pp. 114-118.
- Glandina isabellina**, Pfr.
Sin.: *Achatina isabellina*, Pfr.; *Oleacina isabellina*, Gray.
Hab.: México, en los troncos muertos de los árboles. B. C. A., p. 63; M. S. M., p. 138.
- Glandina longula**, C. et F.
Oleacina longula, C. et F.
Glandina longula, var. *jalapana*.
Hab.: NE. Méx.: Río de San Juan; Misantla, Jalapa. B. C. A., p. 64; M. S. M., p. 111.
- Glandina rhoadsi**, Pilsbrey.
Hab.: Diente, cerca de Monterrey. B. C. A., p. 611.
- Glandina turris**, Pfr.
N. etim.: *Glandina torre*. Latin *turris*, torre.
Sin.: *Achatina turris*, Pfr.; *Oleacina turris*, Gray.; *Acicula turris*, Adams.
Hab.: Mazatlán. B. C. A., p. 65. Oaxaca, á 3000 metros (Uhde). M. S. M., p. 126.
- Glandina mazatlanica**, Mart.
Sin.: *Glandina turris*, Streb.
Glandina mazatlanica, var. *G. abbreviata*.
Hab.: Mazatlán; Tres Marías. B. C. A., p. 65.
- Glandina pseudoturris**, Martens.
Sin.: *Achatina turris*; *Oleacina (G.) pseudoturris*, Streb.
Hab.: SO. y S. Méx.: Tierra Colorada, Gro.; Juquila (Oax.). B. C. A., p. 65.
- Glandina simplex**, Martens.
N. etim.: *Glandina sencilla*. Latin *simplex*, sencillo.
Sin.: *Glandina turris*, Pfr.; *Oleacina (G.) simplex*, Streb.
Hab.: Oaxaca. B. C. A., p. 66.
- Nota*.—Según la Biología sólo se conoce un ejemplar.

Glandina conularis, Pfr.

Sin.: *Achatina* (G.) *conularis*, Pfr.; *Oleacina conularis*, Pfr.

Hab.: México..... B. C. A., p. 66; M. S. M., p. 137.

Glandina excavata, sp. n. Martens.

Sin.: *Gladnina albersi*, Pfr.

Hab.: Mazatlán? B. C. A., p. 66.

Glandina albersi, Pfr.; *Achatina albersi*, Pfr.; *Oleacina albersi*, Pfr.

Hab.: Mazatlán, muy rara; Sierra Madre, Colima. M. S. M., p. 127.

Glandina largillierti, Pfr.

Sin.: *Achatina* (G.) *largillierti*, Pfr.; *Oleacina largillierti*, Gray.; *Achatina* (Gland.) *yucatanensis*, Pfr.; *Glandina yucatanensis*, Gray.; *Oleacina yucatanensis*, Gray.; *Glandina* (*Achat.*) *cylindracea*, Phil.; *Oleacina* (Gland.) *cylindracea*, Pfr.; *Glandina cylindracea*, C. et F.; *Achatina carnea*, Pfr.; *Glandina carnea*, Pfr.; *Oleacina carnea*, Pfr.; *Glandina strebli?*, Aug.

Hab.: Yucatán: Tecanto, Tabí, Ticul, Tinicas, Sítilpech, Izamal, Labna, Mérida; Campeche. B. C. A., p. 67; M. S. M., p. 116.

Glandina cylindracea, Philips.

Hab.: Yucatán. M. S. M., p. 123.

Glandina carnea, Pfr.

Sin.: *Achatina turris*, Desh.; *Achatina carnea*, Pfr.; *Oleacina carnea*, Pfr.

Hab.: México..... M. S. M., p. 124.

Glandina multispira, Pfr.

Sin.: *Oleacina multispira*, Pfr.

Hab.: Juquila, Oax. B. C. A., p. 69; M. S. M., p. 125.

Glandina oblonga, Pfr.

Sin.: *Oleacina oblonga*, Pfr.

Hab.: Centr. Méx.: Tehuacán, Puebla; Mirador, Ver. B. C. A., p. 69; M. S. M., p. 138.

Glandina bellula, C. et F.

Etim.: *Glandina pulidita*. Latín *bellulus*, pulido.

Sin.: *Oleacina bellula*, Pfr.

Hab.: México..... B. C. A., p. 69; M. S. M., p. 128.

Glandina dalli, Pilsbry.

Hab.: NE. Méx.: Diente, cerca de Monterrey. B. C. A., p. 612.

Glandina lanceolata, sp. n. Martens.

Hab.: Omilteme (Gro.). B. C. A., p. 69.

Glandina decidua, Pfr.

Etim.: *Glandina recortada*. Latín *deciduus*, recortado.

Sin.: *Oleacina decidua*, Pfr.

Hab.: S. Méx.: Juquila (Oax.). B. C. A., p. 70.

M. S. M., p. 122.

Glandina cordobana, Pfr.

Sin.: *Achatina* (varicella) *cordobana*, Pfr.; *Oleacina cordobana*, Brimey.

Hab.: Córdoba; Mirador. B. C. A., p. 70; M. S. M., p. 87.

Glandina delicatula, Schuttleworth.

Sin.: *Achatina delicatula*, Schntt.; *Oleacina delicatula*, Gray.

Glandina delicatula, var. *major*, (a).

Hab.: Córdoba, Jalapa; (a) Coatepec. B. C. A., p. 70; M. S. M., p. 92.

Glandina conferta, Pfr.

Etim.: *Glandina apretada*. Latín *confertus*, apretado.

Oleacina conferta, Pfr.

Glandina conferta, var. *erossei* (a).

Hab.: Mirador, Huatusco, Jalapa, Juquila (Oax.), (a) Orizaba? B. C. A., p. 61; M. S. M., p. 131.

Glandina speciosa, sp. n. Martens.

Etim.: *Glandina vistosa*. Latín *speciosus*, vistoso.

Sin.: *Achatina* (varicella) *speciosa*, Pfr.; *Oleacina speciosa*, Pfr.

Hab.: Córdoba, Huatusco, Orizaba. B. C. A., p. 71, M. S. M.

Glandina lignaria, Reeve.

Sin.: *Achatina lignaria*, Reeve; *Oleacina lignaria*, Pfr.

Hab.: Orizaba. M. S. M., p. 97.

Nota.—La Mission Scientifique au Mexique admite dos especies, *G. sowerbyana* y *G. lignaria*; pero la B. C. A. sólo indica la primera, *G. sowerbyana*.

Glandina ambigua, Pfr.

Sin.: *Achatina ambigua*, Pfr.; *Oleacina berrendti*, Pfr.; *Spiraxis?* *ambigua*, Pfr.

Hab.: E. Méx.: Córdoba, bajada del Ojo de Agua; Huatusco, Orizaba. B. C. A., p. 72; M. S. M., p. 139.

Glandina orizabae, Pfr.

Sin.: *Achatina* (varicella) *orizabae*, Pfr.; *Oleacina orizabae*, Pfr.

Hab.: Volcán de Orizaba; Las Vigas. B. C. A., p. 73; M. S. M., p. 85.

Glandina turgida, Pfr.

Etim.: *Glandina hinchada*. Latín *turgidus*, hinchado.

Sin.: *Oleacina turgida*.

Glandina turgida, var. *sayulana*.

Hab.: Juquila (Oax.); Sayula (Jal.). B. C. A., p. 73; M. S. M., p. 130.

Glandina filosa, Pfr.

Etim.: Glandina sutil. Latín *flosus*, sutil.
Sin.: Achatina (G.) filosa, Pfr.; Oleacina filosa, Pfr.
Hab.: Orizaba. B. C. A., p. 74; M. S. M., p. 129.

Glandina fischeri, sp. n. Martens.

Hab.: Toluca. B. C. A., p. 74.

Glandina sulcifera, sp. n. Martens.

Etim.: Glandina surcada. Latín *sulcus*, surco; *fero*, yo llevo.

Hab.: O. Méx.: Jalisco. B. C. A., p. 74.

Glandina albersi, Pfr.

Fórmula dentaria: (32-1-32) × 65 = 4225.

Sin.: Achatina (G.) albersi, Pfr.; Oleacina albersi, Pfr.

Glandina albersi, var. *inflata* (a).

» » » *solidior* (b).

Hab.: Mazatlán (rarísima); Islas Tres Marias; Sierra Madre de Colima; (a) Tepic; (b) SO. Méx.: Colima. B. C. A., p. 75; M. S. M., p. 127.

Glandina monilifera, Pfr.**Glandina monilifera**, var. *pulcherrima* (a).

Etim.: Glandina de collar (var. hermosísima). Latín *monilis*, collar; *fero*, yo llevo; *pulcher*, hermoso.

Sin.: Achatina (G.) monilifera, Pfr. (Reeve); Oleacina monilifera, Gray.; Glandina rubella, Morelet; Achatina (G.) rubella, Morelet; Oleacina rubella, Gray.

Hab.: E. Méx.: Coatepec, Cuautlatlán, Orizaba, Córdoba; SO. Méx.: Omilteme, Gro.; Chiapas; (a) Coatepec. B. C. A., p. 75; M. S. M., p. 89.

Glandina stigmatica, Schuttleworth.

Etim.: Glandina señalada. Latín, señalado ó marcado á hierro (Petronio). *Stigma*, señal.

Sin.: Achatina (Polyphemus) stigmatica, Schutt.; Oleacina stigmatica, Schutt.

Hab.: Córdoba; Orizaba; Atoyac. B. C. A., p. 77; M. S. M., p. 91.

Glandina nana, Schuttleworth.

Sin.: Achatina (Polyphemus) nana, Schutt.; Oleacina nana, Schutt.

Hab.: Córdoba, Misantla. B. C. A., p. 77; M. S. M., p. 133.

Glandina difficilis, F. et C.

Sin.: Oleacina difficilis, Pfr.

Hab.: Orizaba. B. C. A., p. 78; M. S. M., p. 132.

Glandina boucardi, Pfr.

Sin.: Oleacina boucardi, Pfr.

Hab.: San Martín (Ver.). M. S. M., p. 93.

Glandina decussata, Desh.

Sin.: Achatina decussata, Pfr.; Oleacina de-

cussata, Pfr.; Glandina truncata, var. Binney; Glandina carneola, Binney; Oleacina carneola, Binney.

Hab.: México, cerca de Texas. M. S. M., p. 112.

Glandina nymphæ, C. et F.

Hab.: México. M. S. M., p. 115.

Glandina alabastrina, Albers.

Sin.: Oleacina alabastrina, Pfr.; Achatina alabastrina, Pfr.

Hab.: Tabasco. M. S. M., p. 120.

Glandina candida, Schuttleworth.

Etim.: Glandina blanca. Lat. *candidus*, blanco.

Sin.: Achatina candida, Pfr.; Oleacina candida, Pfr.; Acicula candida.

Hab.: Mirador (Ver.). M. S. M., p. 130.

(Género *Glandina*);

Subgénero *Salaciela*, Strebel, 1878.

Etim.: Subgénero formado á expensas del género Glandina y dedicado á la familia Salas (mexicana).

Salaciela margaritacea, Strebel.

Etim.: Salaciela aperlada. Lat. *margarita*, perla.

Sin.: Achatina margaritacea, Pfr.; Oleacina margaritacea, Pfr.; Glandina margaritacea, F. et C. (a).

Hab.: Córdoba, Ver. B. C. A., p. 81; (a) M. S. M., p. 136.

Salaciela joaquinæ, Strebel.

Etim.: Dedicada á Joaquín Salas.

Hab.: Jalapa. B. C. A., p. 81.

Salaciela modesta, Pfr.

Sin.: Oleacina modesta; Glandina modesta (a).

Hab.: Mirador, probablemente subterránea. B. C. A., p. 81; (a) M. S. M., p. 135.

Salaciela perpusilla, Strebel.

Etim.: Salaciela pequeñita. Lat. *perpusillus*, pequeño.

Sin.: Oleacina perpusilla, Pfr.; Glandina perpusilla, Pfr. (a).

Hab.: Mirador; Jalapa, en el bosque de Pacho; Montes cercanos á Orizaba. B. C. A., p. 83; (a) M. S. M., p. 134.

Salaciela pulchella, Strebel.

Etim.: Salaciela pulida. Latín *pulchelus*, pulido, bonito.

Sin.: Achatina pulchella, Pfr.; Oleacina pulchella, Strebel; Glandina pulchella, F. et C. (a).

Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 83; (a) M. S. M., p. 136.

Salaciela elegans, v. Martens.

Etim.: Salaciela elegante.

Hab.: Colima. B. C. A., p. 613.

- Género *Pseudosubulina*, Strebel y Pfeiffer, 1882.
- En B. C. A. Fam. Stenogyridæ.
- Pseudosubulina berendti**, Strebel.
Sin.: *Achatina berendti*, Pfr.; *Subulina berendti*, F. et C.
Hab.: E. Méx.: Orizaba, Pacho, Soncoautla; Consolapa, Dos Arroyos, cerca de Jalapa; Las Vigas. B. C. A., p. 301; M. S. M., I, p. 635.
- Pseudosubulina chiapensis**.
Sin.: *Achatina chiapensis*; *Subulina chiapensis*, F. et C.
Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 303; M. S. M., I, p. 637.
- Pseudosubulina? sargi**.
Sin.: *Subulina sargi*, F. et C.
Hab.: Teapa (Tabasco). B. C. A., p. 303.
- Pseudosubulina? trypanodes**.
Sin.: *Achatina trypanodes*.
Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 303.
- Pseudosubulina berendti**.
» » var. *occidentalis* (a).
Hab.: (a) Uruápam, Mich. B. C. A., p. 638.
- Pseudosubulina texoloensis**.
Hab.: Salto de Texolo (Ver.). B. C. A., p. 639.
- Pseudosubulina robusta**, sp. n. Martens.
Hab.: Omilteme, Gro. B. C. A., p. 304.
- LIMACIDÆ.**
- Etim.: Latin *limax*, *limacis*, el caracol, de la voz *limus*, limo, cieno; singéneo del griego *λειμαξ*, caracol.
- Género *Limax*, Linneo, 1758.
- Limax lœvis**, Martens.
N. común: Caracol ligero, tlaconete. Latín *lœvis*, liviano.
Sin.: *Agriolimax lœvis*, Simroth; *Limax brunneus*, Draparnaud; *Limax campestris*, Binney; *Limax parvulus*, Normand; *Limax guatemalensis*, C. et F.; *Limax (malacolimax) brasiliensis*, Semper; *Limax argentinus*, Strebel; *Limax hyperboreus*, Westerl; *Limax stenurus*, Strebel; *Agriolimax lacustris*, Less. et Pollon.
Hab.: México B. C. A., p. 347.
- Limax jalapensis**, Strebel (1880).
Hab.: Jalapa, sobre las plantas. B. C. A., p. 349.
- Limax maximus**.
N. vulgar: Tlaconete.
Hab.: Tacubaya (ciudad), Panteón de Dolores.
- Género *Zonites*, Montfort, 1810.
- Zonites metanomasticus**, C. et F.
- Etim.: Gr. *ζωρίζης*, que tiene un cinturón; *μετά*, superabundante; *όνομαστικόν*, vocabulario. Zonita que tiene muchos nombres.
Sin.: *Helix zonites*, Pfr.; *Nanina zonites*, Gray.; *Edusa zonites*, Albers.
Hab.: Chiapas; Tuxtla, Ver. M. S. M., p. 157.
- Omphalina zonites**. Jalapa.
- Zonites veracrucensis**, Pfr.
Sin.: *Helix veracrucensis* (Pfr.), W. G. Binney; *Hyalina veraerueensis* (Albers), Martens.
Hab.: Córdoba, Ver. M. S. M., p. 157.
- Zonites lucubratus**, Say.
Sin.: *Helix lucubrata*, Pfr.; *Helix caduca*, W. G. Binney; *Hyalina lucubrata*, Albers.
Hab.: Var. *B* en el monte Tepamacuales, Oax. M. S. M., p. 160.
- Zonites caducus**, Pfr.
Sin.: *Helix caduca*, Pfr.; *Hyalina caduca*, Albers; *Helicella caduca*, H. et A. Adams; *Helix caduca*, var. *B*.
Hab.: Córdoba, Montes en Orizaba; var. *B* en Jacale, cerca del volcán de Orizaba. M. S. M., p. 163.
- Zonites fuliginosus**, Griffith.
Etim.: *Zonites obscura*. Lat. *fuliginosus*, obscuro.
Sin.: *Helix fuliginosa*, Binney; *Hyalina fuliginosa*, Albers; *Helicella fuliginosa*, H. et A. Adams; *Omphalina fuliginosa*, Binney.
Hab.: Orizaba (dudosa). M. S. M., p. 164.
- Zonites tuxtensis**, C. et F.
Hab.: Tuxtla. M. S. M., p. 166.
- Zonites bilineatus**, Pfr.
Etim.: *Zonites* con dos líneas. Lat. *bis*, dos veces; *lineatus*, lineado, rayado.
Sin.: *Helix bilineata*, Pfr.; *Hyalina bilineata*, Albers; *Helicella bilineata*, H. et A. Adams; *Zonitalina bilineata*, Marteus.
Hab.: Córdoba. M. S. M., p. 167.
- Zonites selenkai**, Pfr.
Sin.: *Helix selenkai*, Pfr.
Hab.: Var. *B*, Mirador. M. S. M., p. 171.
- Zonites subhyalinus**, Pfr.
Sin.: *Helix subhyalina*, Pfr.
Hab.: Tehuantepec. M. S. M., p. 172.
- Zonites tehuantepensis**, C. et F. (Véase nota).
Hab.: Tehuantepec. M. S. M., p. 174.
- Zonites minusculus**, A. Binney.
Sin.: *Helix minuscula*, Pfr.; *Helix apex*, C. B. Adams; *Hyalina minuscula*, Albers; *Helicella minuscula*, H. et A. Adams; *Microphysa apex*, Albers; *Microphysa minuscula*, Albers; *Pseudohyalina minuscula*, G. Tryon.

Hab.: Palizada, Yucatán. B. C. A., p. 175.
Zonitoides minusculus. Topo Chico, N. León.

Zonites elegantulus, Pfr.

Sin.: *Helix elegantula*, Pfr.

Hab.: Veracruz.

Subgénero *Hyalinia*, Féruccae, 1819.

Etim.: Gr. *ύαλινος*, de vidrio, cristal; latín *hyalinus*, lo que es de vidrio; cristalino.

Hyalinia permodesata.

Hab.: Mirador, cerca de Jalapa. B. C. A., p. 117.

Nota.—En la B. C. A. se describen en el género *Hyalinia* el *Zonites tehuantepensis*, Z. subhyalinus; el *Z. subhyalinus* con el nombre de *Hyalinia arborea*.

Subgénero *Vitrea*.

Vitrea indentata.

Sin.: *Hyalinia indentata*; *Helix indentata*, Say.

Hab.: Yautepec, Morelos; Confluencia del Río Balsas. B. C. A., p. 17.

Subgénero *Stenopus*, Guilding, 1828.

Sinonimia: *Guppya*, Mörch.

Guppya trochulina, sp. n. Martens.

Sin.: *Zonites selenkai*, Pfr.; *Zonites trochulina*, Pfr.

Hab.: Agua Caliente, cerca de Misantla, Jalapa. B. C. A., p. 120.

Guppya elegans.

Sin.: *Stenopus elegans*, Pilshy; *Habroconus elegans*, Strebel.

Hab.: Bosque de Pacho, cerca de Jalapa, Orizaba; Yautepec, Morelos. B. C. A., p. 121.

Guppya gundlachi.

Sin.: *Zonites fulvoidea*, Morelet; *Helix fulvoidea*, Morelet; *Hyalinia fulvoidea*, Marteus.

Hab.: Isla del Carmen, á la entrada de la laguna de Términos. B. C. A.; M. S. M., p. 117.

Subgénero *Pseudohyalinia*.

Pseudohyalinia minuscula, Morse.

Véase *Zonites minusculus*. B. C. A., p. 124.

Pseudohyalinia berendti.

Sin.: *Pynogyra berendti*, Pfr.

Hab.: Mirador, Jalapa, Coatepec, Consolapa, Dos Arroyos; Texolo, Ver.

Pseudohyalinia cidariscus, sp. n. Martens.

Hab.: Palenque. B. C. A., p. 126.

PHILOMYCIDÆ.

Etim.: Griego φίλεω, yo amo; φίλος, amigo, amante; μυκής, hongo; que tiene amor á los hongos.

Género *Philomycus*.

Philomycus sallei, Mart.

Sin.: *Tebenophorus sallei*, C. et F.

Hab.: Playa Vicente (V. C.). B. C. A., p. 345, M. S. M., p. 191.

Philomycus crosseanus, Mart.

Sin.: *Tebenophorus crosseanus*.

Hab.: México..... B. C. A., p. 346.

HELICIDÆ.

Género *Xanthonyx*.

Xanthonyx salleanus, Martens.

Etim.: Griego ξανθός, amarillo; ὄνυξ, uña; uña amarilla.

Sin.: *Simpulopsis salleana*, Pfr.

Hab.: Pacho (Xal.), Córdoba, Oaxaca. B. C. A., p. 344; M. S. M., p. 199, I.

Xanthonyx cordobanus, Martens.

Sin.: *Simpulopsis cordobana*, Pfr.

Hab.: San Antonio del Monte, entre Jalapa y Orizaba; Córdoba. B. C. A., p. 344; M. S. M., p. 200.

Xanthonyx sumichrasti, C. et F.

Sin.: *Vitrina sumichrasti*, Brot.

Hab.: México. B. C. A., p. 344; M. S. M., p. 201.

Xanthonyx chiapensis, Martens.

Sin.: *Simpulopsis chiapensis*, Pfr.

Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 344.

Género *Helix*, Linneo, 1758.

Subgénero *Acanthinula*.

Helix granum, Martens.

Etim.: Griego ἑλιξ, espiral; ἀκάρδινος, espinoso; de ἄκαρδα, espina; en latín *acanthinus*, forma diminutiva *acanthinulus*, espinosillo. Latín *granum*, grana ó cochinilla. Hélice cochinilla.

Sin.: *Acanthinula granum*, Strebel; *Patula granum*, Strebel.

Hab.: Mirador, cerca de Jalapa; Yucatán, Progreso. B. C. A., p. 131.

Helix punctum, Martens.

Etim.: Espira ó caracol picado; *punctum*, picado.

Sin.: *Helix (Patula) punctum*, Morelet.

- Hab.: San Juan Bautista (Tab.); Yue., Mérida. B. C. A., p. 131.
- Helix intonsa**, Martens.
Etim.: Hélice sin trasquilar: *intonsus*, no trasquilado el pelo.
Sin.: Patula intonsa, Pilshy.
Hab.: Orizaba. B. C. A., p. 132.
Subgénero *Trichodiscina*.
- Helix coactiliata**, Mart.
Etim.: Hélice cubierta con fieltro. Tricodiscina: disco de pelo. Ωρίξ, τριχός, pelo; *discus*, disco; *coactilius*, fieltro; *coactilia*, fieltro de lana no tejida, sino incorporada con goma para que tenga cuerpo.
Sinon.: Trichodiscus coactiliatus, Férrussac; Patula coactiliata, Férrussac; Helix teniata, Nyssen; Helix nystiana, Pfr.; *Helix* bridgesi, Tryon; *Helix* parkeri, Tryon.
Hab.: Tabasco; Yue.: Tunkas, Labna. B. C. A., p. 133.
- Helix cordobana**, Martens.
Sin.: *Helix* coactiliata, var. *B*, cordobana; *Helix* (patula) coactiliata, var. *B*; *Trichodiscus* cordobanus, Pfr.
Hab.: SO. Méx.: Omilteme, Gro.; Oaxaca; E. Méx.: Tuxpan, S. de Tampico, Nacimiento de Quilate; Cerro de Espaldilla y Rancho de Gue rrero, cerca de Misantla; Chirimoyo, Coatepec, Dos Arroyos, Soncoautla; Consolapa y Barranca de Teocelo, cerca de Jalapa; Mirador, Misantla, Soledad, Almolonga, Córdoba, Atoyac; SE. Méx.: Colima. B. C. A., p. 135.
Tricodiscina cordobana, Pfr.
Hab.: Diente, Monterrey, N. L.
- Helix suturalis**, Martens.
Sin.: *Discus* suturalis; *Helix* (Patula) coactiliata, var. γ suturalis.
Hab.: Teapa (Tab.). B. C. A., p. 136.
- Helix oajacensis**, Martens.
Sin.: *Trichodiscus* oajacensis.
Hab.: Oaxaca. B. C. A., p. 136.
- Helix sumichrasti**, Martens.
Hab.: Soledad, entre Córdoba y Orizaba; Istmo de Tehuantepec. B. C. A., p. 137.
Subgénero *Praticolella*.
- Helix ampla**, Martens.
Sin.: *Helix* (Patula) ampla, C. et F.; *Praticola* ocampi, Streb.
Etim.: Latin *pratum*, prado; *colere*, habitar.
Praticola. Género establecido por Streb, 1879.
Praticolella, diminutivo de *Praticola*.
Hab.: Misantla, rancho de Guerrero, río de Mi santla, Almolonga, Jalapa, Monte de Xacaquicapa, Dos Arroyos, Mirador, Consolapa, San Anto nio del Monte, San Rafael, Xicaltepec. B. C. A., p. 138.
- Helix strebiana**, Martens.
Sin.: *Praticolella* strebiana, Pilsbry.
Hab.: Diente, cerca de Monterrey, N. L.—B. C. A., p. 623.
- Helix berlanderiana**, Martens.
Sin.: *Hygromia* berlanderiana, Moriceaud; *Dor casia* berlanderiana, Moriceaud; *Praticola* berlanderiana, Moriceaud; *Helix* pachyloma, Menke.
Hab.: Tamaulipas, Chapalito; Ventanas, Dgo.; Veracruz, con la variedad *griseola*; Sayula (Jal.).
VARIEDAD: *Helix berlanderiana*, var. *griseola*.
Sin.: *Helix* cicercula, Férrussac; *Helix* splendi dula, Ant.; *Helix* *griseola*, Pfr.; *Helix* albocineta, Binney; *Helix* albozonata, Binney; *Helix* albolineata, A. Gould; *Brodybæna* pisum, Beck.; *Hygromia* *griseola*, Pfr.; *Doreasia* *griseola*, Pfr.; *Praticola* *griseola*, Pfr.; *Helicogona* (*Arionta*) *griseola*, Pfr.
Hab.: Alrededores de Veracruz; Córdoba; Tamaulipas; San Rafael Sicaltepec; San Carlos, O. de Oaxaca. B. C. A., p. 140.
- Subgénero *Arionta*.
- Helix flavesiensis**, Martens.
Etim.: Hélice enrojecido. Lat. *flavesco*, enrojecerse.
Sin.: *Helix* (arionta) *flavescens*, Wiegman; *Helix* (praticola) *flavescens*, Wiegman; *Helix* (leptarionta) *flavescens*, Wiegman; *Higromia* *flavescens*, Adams.
Hab.: E. Méx.: Papantla. B. C. A., p. 142.
- Helix trypanomphala**, Martens.
Etim.: Hélice de ombligo taladrado. Griego $\tauρύπνων$, barreno, taladro; $\circμφαλός$, ombligo.
Sin.: *Helix* fruticicola *trypanomphala*, Pfr.
Hab.: Sierra Madre. En B. C. A., p. 143, Sie rra Maestra!
- Helix trypanomphala**, var. remondi.
Sin.: *Helix* remondi, Tryon; *Helix* arionta remondi, Tryon.
Hab.: Guaymas (Sin.); Ventanas (Dgo.); Te pic, Sayula (Jal.). B. C. A., p. 143.
- Helix magdalenensis**, Martens.
Sin.: *Helix* arionta magdalenensis, Stearns.
Hab.: Magdalena (Son.). B. C. A., p. 144.
- Helix ariontakelleti**, Gabb.
Hab.: Baja California.
- Subgénero *Pomatia*.
- Helix aspersa**.
Etim.: Caracol salpicado de lodo. Gr. $\pi\omegaμάτιας$, un caracol operculado, de $\pi\omegaμά$, cu bierta, tapadera. Lat. *aspersus*, esparcido, de *aspergo*, parcir, rociar, salpicar *Apes.versus lutos*

(Hor.), salpicado de lodo. El pomatia aspersa puede reconocer su etimología por su abundancia en los lugares que habita *esparciéndose* por todos lados, ó bien á su aspecto ordinario, que se encuentra salpicado de lodo.

Sin.: *Cochlea vulgaris*, Lister; *Pomatia aspersa*, Müller.

Hab.: Jaral (Gto.); alrededores de México, abundante, especialmente en el parque de Chapultepec.

Pomatia aspersa, Müller.

Hab.: Misantla, Tacubaya.

Subgénero *Lysinoë*.

Helix humboldtiana, Mart.

Variedad b. *Hegevischi* (1).

Helix pomatia humboldtiana, Val. (2).

Pomatia humboldtiana, Val. (3).

Hab.: México (1), Durango (2), Desierto, Ven-
ta de Cuajimalpa (3).

Pomatia humboldtiana.

Hab.: Real del Monte (Hgo.), Puebla.

Variedad c. *Högeana*.

Helix humboldtiana, Pfr.

Hab.: Chihuahua.

Variedad d. *Buffoniana*.

Helix buffoniana.

Arionta humboldtiana, var. *buffoniana*.

Helix ventrosula, Uhde.

Hab.: Rio Frio; de México á Puebla; alrededo-
res de la ciudad de México.

Lysinoë humboldtiana buffoniana, Pfr.

Hab.: Diente, Monterrey.

Variedad e. *Badiocincta*.

Helix badiocincta, Wiegman.

Helix aspersa, Binney.

Helix humboldtiana, var. a.

Arionta humboldtiana, Val.

Hab.: Alrededores de México.

Variedad f. *Queretaroana*.

Helix lysinoë queretaroana, Dall. (a).

Hab.: Ciudad de México; Pinal de Amoles
(Quer.). (a). B. C. A., p. 147 y p. 625 (a).

Helix sebastiana, Mart.

Helix lysinoë sebastiana.

Hab.: San Sebastián (Jal.). B. C. A., p.
625.

Helix ghiesbreghti, Mart.

Variedad a. *typica*.

Macrocyllis (lysinoë) ghiesbreghti, Nysten.

Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 150.

Subgénero *Oxychona*.

Helix bicineta, Mart.

Helix leptarionta bicineta, Pfr.

Corsaria bicineta, Pfr.

Hab.: Oaxaca; Juquila; Panistlahuaca; So-
ledad, entre Córdoba y Orizaba. B. C. A., p.
157.

Helix guillarmodi, Martens.

Helix corsaria guillarmodi, Schuttleworth.

Axina guillarmodi, Schuttleworth.

Hab.: Túxpam, cerca de Córdoba; Cerro de
Palmas, V. C.—B. C. A., p. 158.

Especies dudosas. B. C. A.

Helix mexicana, Mart. B. C. A., p. 160.

Helix tenuicostata, Mart. B. C. A., p. 161.

Helix biceruris, Pfr. Véase *Polygyra biceruris*.

Hab.: Sultepec; G. de Cal.

Helix disimilis, Binney.

Melanthro desirâ, Say.

Subgénero *Patula*.

Pyramidula hermani, Pfr.

Hab.: Morelia (Mich.).

Subgénero *Anchistoma*.

Helix thyroides, Say.

Sin.: *Mesodonthyroides*, Binney.

Hab.: G. de Cal.

Strobila strebeli.

Sin.: *Strobilos strebeli*?

Hab.: Monterrey, N. L.

Strobila labyrinthica.

Sin.: *Helix labyrinthica*.

Etim.: *στρόβιλος*, una cosa trenzada, torci-
da; caracol marino; *στρίφην*, girar.

Hab.: Mirador, V. C.

Género *Polygyra*.

(Familia Aulacognatha. B. C. A.).

Etim.: Gr. *πολύγυρος*, que tiene muchas es-
piras; *πολύ*, mucho; *γύρος*, anillo, vuelta. *Αὐ-
λαξ*, *αὐλάκος*, surco, estría, arruga; *γράδος*,
maxila; maxila arrugada.

Polygyra implicata, Martens.

Etim.: Poligira enroscada. Lat. *implicatus*,
enroscado.

Sin.: *Helix (daedalochila) implicata*, Beck.; *He-
lix oppilata*, Pfr.

Hab.: Rio Tecoluta, Ver.; Agua Caliente, Ran-
cho Guerrero; Caminos de Arroyo Hondo y del
Obispo, cerca de Misantla; Barranca de Mahuis-
tlán, entre Jalapa, Mirador y San Juan Miahua-
tlán; Jalapa, Ver.; Oaxaca; Misantla. B. C. A.,
p. 164.

Polygyra oppilata, Morel.

Etim.: Poligira tapada. Lat. *oppilatus*, ob-
truido, tapado.

Sin.: *Helix oppilata*, Morel.

Hab.: Veracruz, Yucatán, Istmo de Tehuante-
pec. B. C. A., p. 164.

Polygyra chiapensis, Mart.

- Sin.: *Helix dorfeuilleana*, Pfr.; *Helix dysoni*, Schuttleworth.
Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 165.
- Polygyra mooreana**, Mart.
Sin.: *Helix mooreana*, Binney; *Dædalochila mooreana*, Binney; *Helix texasiana*, var. minor.
Variedad, *tholus*.
Helix polygyra tholus, Binney.
Dædalochila tholus, Binney.
Helix couloni, Martens.
Hab.: Veracruz. B. C. A., p. 166.
- Polygyra yucateana**, Martens.
Sin.: *Helix yucateana*; *Triodopsis yucateana*, Morelet.
Hab.: San Juan Bautista (Tab.), Yucatán, Isla del Carmen, Laguna de Términos.
Variedad: *helictomphala*.
Polygyra helictomphala, Pfr.
Etim.: Poligira de ombligo encorvado. Gr. ἔλιξ, ἔλικος, y ὄμφαλός, ombligo. También puede ser híbrida la voz, de *elicere*, hacer aparente una cosa; *elictus*, aparente; (*elict*-*omphalos*). La primera es más correcta.
Hab.: San Juan Bautista (Tab.). B. C. A., p. 166.
- Polygyra plagioglossa**, Pfr.
Etim.: Gr. πλάγιος, oblicuo; γλῶσσα, lengua.
Sin.: *Helix plagioglossa*, Pfr.
Hab.: E. de Puebla, Oaxaca. B. C. A., p. 167.
- Polygyra dissecta**, sp. n. Martens.
Etim.: Poligira hendida. Latín *dissectus*, hendido.
Hab.: Toluca. B. C. A., p. 167.
- Polygyra couloni**, Mart.
Sin.: *Helix couloni*, Schuttleworth; *Anchistoma couloni*, Schuttleworth.
Hab.: Córdoba, Jalapa, Maltrata; Sayula (Jal.); México, Cuernavaca; Omilteme (Gro.). B. C. A., p. 167.
- Polygyra bicurvis** (Pfr.), Martens.
Etim.: Poligira de dos piernas: *bis*, dos; *crujis*, pierna.
Sin.: *Helix bicurvis*, Pfr.
Hab.: Islas Tres Marías; Ventanas, Dgo.; Colima. B. C. A., p. 168.
- Polygyra richardsoni**, sp. n. Mart.
Hab.: Presidio de Mazatlán, Sinaloa; Colima. B. C. A., p. 168.
- Polygyra ventrosula**, Martens.
Sin.: *Helix ventrosala*, Pfr.; *Dædalochila ventrosula*, Pfr.
Variedad: *hindsi* (a).
Hab.: Islas Tres Marías; Sierra Madre; Colima; Tepic; (a) México? B. C. A., p. 169.
- Polygyra texasiana**, Martens.
Sin.: *Helix polygyra tamaulipense*, Lea.; *Helix triodopsis trivonia*, Beck.; *Dædalochila texasiana*, Tryon.
Hab.: Tamaulipas, Veracruz. B. C. A., p. 170.
- Polygyra behri**, Martens.
Sin.: *Helix behri*, Gabb.; *Dædalochila behri*, Gabb.
Hab.: Guaymas (Son.). B. C. A., p. 171.
- Polygyra ariadnæ**, Martens.
Sin.: *Helix ariadnæ*, Pfr.; *Anchistoma ariadnæ*, Pfr.; *Dædalochila ariadnæ*, Pfr.; *Helix polygyra conchiana*, Lea.
Hab.: Tamaulipas, Matamoros, Veracruz. B. C. A., p. 171.
- Polygyra acutedentata**, Binney.
Etim.: Poligira con dientes aguzados: *acute*, aguzadamente; *dentatus*, dentado.
Variedad: *loisa* (a).
Sin.: *Dædalochila acutedentata*.
Hab.: Guaymas, Mazatlán, Río de Sinaloa, (a) Mazatlán. B. C. A., p. 172.
- Polygyra anilis**, Martens.
Etim.: Poligira vetusta. Lat. *anilis*, lo perteneciente á las viejas.
Sin.: *Helix (polygyra) anilis*, Gabb.
Hab.: Guaymas. B. C. A., p. 172.
- Polygyra nelsoni**, Martens.
Hab.: San Sebastián (Jal.). B. C. A., p. 628.
- Polygyra rhoadsi**, Martens.
Hab.: Topo Chico, Monterrey, N. L.—B. C. A., p. 628.
- Polygyra suprazonata**, Martens.
Etim.: Poligira de zonas superficiales.
Hab.: Tzintzuntzan, Mich. B. C. A., p. 628.
- Polygyra maternotana**, Martens.
Etim.: Poligira de la Sierra Madre.
Hab.: Colima, Sierra Madre.
- Polygyra ponsonbyi**, Martens.
Hab.: México. B. C. A., p. 629.
- Polygyra euglypta**, Martens.
Etim.: Poligira bien escalpida. Gr. εὖ, bien; γλύπτω, esculpir; γλυπτός, esculpido.
Hab.: Sinaloa, Mazatlán. B. C. A., p. 629.
- Polygyra albicostulata**, Martens.
Etim.: Poligira de costillas blancas. Lat. *albus*, blanco; *costulatus*, con costillas.
Hab.: México. B. C. A., p. 629.
Subgénero *Patula*, Held, 1837.
(Gén. *Patula*, Fam. *Aulacognatha*. B. C. A.).
Etim.: Latín *Patulus*, *a*, *um*, abierto, ancho, extendido, haciendo referencia á lo ancho del ombligo (*a wide umbilicus*) que caracteriza al género.

Patula mazatlanica, Mart.Sin.: *Pseudohyalina mazatlanica*, Pfr.

Hab.: Mazatlán. B. C. A., p. 127.

Patula hermanni, Martens.Sin.: *Helix hermanni*, Pfr.

Hab.: Mirador, Orizaba. B. C. A., p. 128.

Patula wilhelmi.Sin.: *Helix wilhelmi*, Pfr.; *Microconus wilhelmi*, Pfr.

Hab.: Mirador. B. C. A., p. 128.

Patula conspurcatella, Martens.Etim.: *Patula manchadita*. Latín *conspurcatus*, manchado.Sin.: *Helix conspurcatella*, Morelet; *Thysanophora conspurcatella*.

Hab.: Veracruz, Mérida, Tunkas y Tekanto, San Juan Bautista. B. C. A., p. 128.

Patula impura, Martens.Sin.: *Helix impura*, Pfr.; *Thysanophora impura*, Pfr.

Hab.: Mirador, Veracruz, Yautepec, Morelos. B. C. A., p. 129.

Patula paleosa, Martens.Etim.: *Patula pajiza*. Latín *palea*, paja.Sin.: *Thysanophora paleosa*, Streb.

Hab.: Jalapa, Orizaba. B. C. A., p. 129.

Patula strigosa, Martens.Etim.: *Patula macilenta*. Latín *strigosus*, flaco, macilento.Sin.: *Helix strigosa*, A. Gould.

Hab.: Sonora. B. C. A., p. 621.

Patula proxima, Martens.Sin.: *Thysanophora proxima*, Pilsbry.

Etim.: Gr. οὐσάνος, borla; φορός, el que lleva.

Hab.: Uruá pam, Morelia, Pátzcuaro, Huingo. B. C. A., p. 622.

Subgénero *Acavus*, Montfort, 1810.**Acavus hæmastoma**.Sin.: *Helix hæmastoma*.

Hab.: México. B. C. A., p. 117.

Subgénero *Cochlea*, Adams, 1855.**Aglaia ghiesbreghti**, Nyst.

Hab.: Río Blanco, Ver.

Aglaia eximia, Pfr.

Hab.: Jalapa.

Género *Bulimus*, Scopoli, 1887.

(Familia Goniognatha. B. C. A.).

Bulimus spirifer, Gabb.Etim.: dudosa. Latín *bulimus*, hambre canina.

Hab.: Baja California.

Bulimus nitens, Philippi.

Hab.: Texas á Tehuantepec.

Género *Berendtia*, C. et F., 1869.**Berendtia taylori**, Pfr.

Etim.: Especie dedicada á Berendt y á Taylor.

Hab.: Baja California. Dr. P. Fischer. Man. de Conchyl. Paris, 1887, p. 473.

ORTHALICIDÆ.

(Fam. Goniognatha. B. C. A.).

Género *Orthalicus*, Beck, 1837.**Orthalicus princeps**, Martens.

Etim.: Gr. ὁρθύς, recto; ἀλικός, semejante.

Sin.: *Bulimus princeps*, Brod.; *Bulimus undatus*, Bny.; *Bulimus zebra*, var. *S*, Pfr.; *Orthalicus zebra*, Müller.

Hab.: Presidio, Mazatlán; Islas Tres Marias, Papantla, Misantla, ranchos de Luna y Quilate; Playa Vicente; Coatepec, Almolonga, Mirador, Callejones de Malibran (Ver.); Córdoba; Atoyac; Ixtapa; Panistlahuaca; Cerro de Acatepec (Oax.); Mérida, Tabí, Ticul, Silam, Skolak (Yuc.). B. C. A., p. 182. Alturas de Río Blanco (Ver.).

Orthalicus ferussaci, Martens.Sin.: *Zebra mülleri*, Chemnitz; *Helix undata*, Férrussac; *Bulimus undatus*, Brugière; *Orthalicus zebra*, Mol.

Hab.: Tehuantepec, Selikolak, Tekanto (Yuc.). B. C. A., p. 184.

Orthalicus zoniferus, Martens.

Hab.: Guerrero: Chilpancingo, Venta de Zopilote, rancho del Platanillo, cerca de Iguala, monte Pelegrino, monte de Acapuleo; Oaxaca; Colima. B. C. A., p. 186.

Orthalicus lividus, Martens.Etim.: Ortálico pálido. Lat. *lividus*, pálido.Sin.: *Bulimus zebra*, var. Menke.

Hab.: Mazatlán; Volcán del Jorullo (Mich.). B. C. A., p. 186.

Orthalicus boucardi, Pfr.

Hab.: Villa Alta, Río de San Juan, Montes de Betaza (Oax.); Cerro Negro, Tehuantepec. B. C. A., p. 189.

Orthalicus livens, Martens.Variedad, *uhdeanus*.Etim.: Ortálico amoratado. Latin *livens*, amoratado.

Hab.: Veracruz, Michoacán. B. C. A., p. 189.

Orthalicus ponderosus, Martens.Etim.: Ortálico pesado. Lat. *ponderosus*, pesado.Sin.: *Orthalicus boucardi ponderosus*; *Orthalicus lividus princeps*, Streb.

Hab.: San Blas (Jal.); Tepic; Culata, cerca de Manzanillo (Col.); Dos Arroyos, Gro.; Tehuantepec; Colima. B. C. A., p. 190.

Orthalicus melanochilus, Valen.

Etim.: Ortálico de labio negro. Gr. *μελανός*, negro; *χεῖλος*, labio.

Sin.: *Bulimus zebra*, var. *E*, Pfr.; *Orthalicus zebra*, Müller.

Hab.: Islas Tres Marias; Mazatlán; Sierra Madre (Jal.). B. C. A., p. 190.

Orthalicus princeps, var. *elegans* (Rolle), Martens.

Hab.: Colima. B. C. A., p. 629.

Orthalicus zoniferus, var. *nobilis*, Martens.

Hab.: Colima. B. C. A., p. 629.

Orthalicus undatus, Brod.

Hab.: Misantla, Actopan.

Hab.: Yucatán, Tabí; (a) Campeche. B. C. A., p. 250.

Bulimulus lilacinus, Reeve.

Hab.: Misantla (Ver.).

Bulimulus pallidior, Sowerby.

Hab.: Baja California.

Bulimulus delattrei, Gabb.

Hab.: Jalapa, Actopam.

Bulimulus vesicalis, Gould.

Hab.: Baja California.

Bulimulus baileyi.

Hab.: Camp. y Mulegé.

Bulimulus hegewischi, Martens.

Hab.: Alrededores de México, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Tehuacán, Tenango, Orizaba; Omilteme. B. C. A., p. 211.

Subgénero *Goniognathus*, C. et F., 1875.

Sección *Otostomus*.

(Fam. *Goniognatha*. B. C. A.).

Género *Bulimulus*, Leade, 1814.

Bulimulus schiedeanus, Martens.

Sin.: *Orthalicus (mesembrinus) schiedeanus*; *Bulimulus (thaumastus) schiedeanus*; *Bulimus xanthostonens*, Wiegman; *Bulimus nivens*, Hgewisch; *Bulimus candidissimus*, Nysten; *Bulimus dealbatus*, var. Binney.

Variedad: *patriarcha* (1).

Hab.: Tamaulipas, cerca de Texas; Lerdo, Dgo.; Tehuacán (Puebla); Lago de Chapala (Jal.); (1) Buena Vista, N. L.—B. C. A., p. 239.

Bulimulus alternatus, Martens.

Hab.: Matamoros (Tamaulipas). B. C. A., p. 243.

Bulimulus sufflatus, Martens.

Etim.: B. inflado. Latín *sufflatus*, hinchado, inflado.

Hab.: Región del Pacífico. B. C. A., p. 244.

Bulimulus gruneri, Martens.

Hab.: México. B. C. A., p. 245.

Bulimulus durangoanus, Martens.

Hab.: Ciudad Lerdo, Dgo. B. C. A., p. 246.

Bulimulus cornens, var. *minor*.

Hab.: San Andrés Tuxtla (Ver.). B. C. A., p. 248.

Bulimulus coriaceus, Martens.

Var. *berendti*.

Hab.: Jalapa, Orizaba, Córdoba, «Callejones» (Ver.), Tuxpam, Atoyac, Tabasco, Teapa, San Juan Bautista, Cacoprieto, Tehuantepec. B. C. A., p. 248.

Bulimulus inermis, Martens.

Hab.: Campeche, Palizada. B. C. A., p. 249.

Bulimulus dysoni, Martens.

Variedad: *ignarus* (a).

Hab.: Manzanillo; México ... B. C. A., p. 200.

Otostomus serperastrum, Martens.

Sin.: *Bulimus serperastrus*, Say; *Bulimus (Drymæns) serperastrum*, Pfr.; *Bulimus liebmanni*, Pfr.; *Bulimus nitelinus*, Reeve; *Bulimus paivanus*, Pfr.; *Otostomus paivanus*, Martens.

Hab.: Camino de Veracruz á México; Jalapa, Córdoba, Tierra Colorada, entre Jalapa y Veracruz; Paso de San Juan y Loma de Piedra, en el Río Jamapa, cerca de Veracruz; Paso de Ovejas, cerca de Mirador; Bobo, cerca del Puerto de Veracruz; Yucatán, Sisal. B. C. A., p. 203.

Otostomus chiapensis, Martens.

Sin.: *Bulimus chiapensis*. Strebel; *Bulimulus chiapensis*, Strebel; *Bulimulus (Drymæus) delattrei*; *a, typicus*; *b, quadriserratus*, *c, nebulosus*; *Bulimulus chiapensis*, var. *γ*.

BULIMULIDÆ.

(Fam. *Goniognatha*. B. C. A.).

Género *Bulimulus*, Leade, 1814.

Etim.: El nombre de *Otostomus* fué propuesto por Beck (Index, Moll., p. 55, 1838) para el grupo del antiguo género *Bulimus*, el cual contenía el *Bulimus aurisleporis*, y de aquí la adaptación al griego: *οὖς οὐρά*, oreja; *στόμα*, boca; que pasó al latín *otostoma* ú *otostomus* (leporino).

Otostomus dombeyanus, Martens.

Sin.: *Bulimulus (Drymæns) dombeyanus*, Pfr.; *Bulimulus (seutalus) dombeyanus*, C. et F.; *Lymnaea rugosa*, Val.; *Bulimus alcantaræ*, var.

Hab.: Ajusco; Venta de Zopilote (Gro.); México ... B. C. A., p. 199.

Otostomus fenestratus, Martens.

Etim.: O. con ventanas. Latín *fenestratus*, que tiene ventanas.

Sin.: *Bulimus fenestratus*, Pfr.; *Bulimulus (seutalus) fenestratus*, F. et C.; *Bulimulus (otosomus) plescheli*, Martens.

Hab.: Manzanillo; México ... B. C. A., p. 200.

Otostomus paivanus, Martens.

Sin.: *Bulimus serperastrus*, Say; *Bulimus (Drymæns) serperastrum*, Pfr.; *Bulimus liebmanni*, Pfr.; *Bulimus nitelinus*, Reeve; *Bulimus paivanus*, Pfr.; *Otostomus paivanus*, Martens.

Hab.: Camino de Veracruz á México; Jalapa, Córdoba, Tierra Colorada, entre Jalapa y Veracruz; Paso de San Juan y Loma de Piedra, en el Río Jamapa, cerca de Veracruz; Paso de Ovejas, cerca de Mirador; Bobo, cerca del Puerto de Veracruz; Yucatán, Sisal. B. C. A., p. 203.

Otostomus chiapensis, Martens.

Sin.: *Bulimus chiapensis*. Strebel; *Bulimulus chiapensis*, Strebel; *Bulimulus (Drymæus) delattrei*; *a, typicus*; *b, quadriserratus*, *c, nebulosus*; *Bulimulus chiapensis*, var. *γ*.

Hab.: Córdoba, Cerro de Palmas, Orizaba, Coatepec, Cuautitlán, Cumbre de Manzanillo, Chiapas. B. C. A., p. 205.

Otostomus dunkeri, Martens.

Sin.: *Bulimus dunkeri*, Pfr.; *Orthalicus (Mesembrinus) dunkeri*, Adams; *Bulimulus (scutalus) dunkeri*, Mart.

Variedad: *forreri* (a).

Hab.: E. de Michoacán; Tepic; (a) Chihuahua; Ventanas (Dgo.); México B. C. A., p. 207.

Otostomus chaperi, Martens.

Hab.: Chapala.

Otostomus colimensis.

Hab.: Colima.

Otostomus ghiesbreghti.

Variedad: *iodostylus* (a).

Hab.: Chiapas, Tlacolula, (a) Santa Efigenia, Tehuantepec. B. C. A., p. 209-210.

Otostomus sulcosus, Martens.

Sin.: *Bulimulus sulcosus*, Albers; *Bulimus hyematus*, Reeve.

Variedad: *botteri*.

Hab.: Valle de México, Tacubaya; Sierra de las Aguas Escondidas; Túxpam; Orizaba. B. C. A., p. 208.

Otostomus rudis, Martens.

Sin.: *Bulimus rudis*; *Orthalicus (Mesembrinus) rudis*; *Bulimulus rudis*; *Bulimulus sulcosus*; *Bulimulus (scutalus) sulcosus*, var. B.

Hab.: México, Chapultepec; Anguangoa (Mich.). B. C. A., p. 209.

Otostomus aurifluus, Martens.

Sin.: *Bulimus aurifluus*, Pfr.; *Bulimulus (mormus) aurifluus*, Martens; *Bulimulus (drymæus) aurifluus*, F. et C.; *Bulimulus aurifluus*, Streb.

Hab.: Jalapa, Mirador, Córdoba, Túxpam, cerca de Córdoba; Yalalag; Juquila (Oax.). B. C. A., p. 213.

Otostomus recluzianus, Martens.

Sin.: *Bulimulus recluzianus*, Pfr.; *Bulimulus (oxycheilus) recluzianus*, Albers; *Bulimulus (mesembrinus) recluzianus*, Pfr.; *Orthalicus (oxycheilus) recluzianus*, Adams; *Bulimulus (drymæus) recluzianus*, Mart.; *Bulimulus (scutalus) recluzianus*, F. et C.

Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 213.

Otostomus cucullus, Martens.

Etim.: O. de cogulla. Lat. *cucullus*, cogulla.

Sin.: *Bulimus cucullus*, Morelet; *Bulimus (leptomerus) cucullus*, Pfr.; *Bulimulus (mormus) cucullus*, Martens; *Bulimulus (scutalus) cucullus*, F. et C.; *Bulimulus (scutalus) cucullus*, var. *gracilior*.

Hab.: Yucatán. B. C. A., p. 214.

Otostomus fenestrellus, Martens.

Sin.: *Bulimulus (scutalus) fenestrellus*; *Bulimulus fenestrellus*, Pfr.; *Bulimulus gealei*, Adams; *Bulimulus (scutalus) gealei*, C. et F. M. C. G. E., núm. 57.

Variedad: *subunicolor*.

Hab.: Matamoros, Izúcar (Pbla.); Puebla; Pátzcuaro (Mich.). B. C. A., p. 214.

Otostomus attenuatus, Martens.

Sin.: *Bulimus attenuatus*, Pfr.; *Bulimus (liostracus) attenuatus*, Pfr.; *Bulimulus (drymæus) attenuatus*, Martens; *Bulimus kefersteine*, Pfr.

Hab.: Veracruz, Orizaba, Córdoba, Atoyac, Mirador, México. B. C. A., p. 215.

Otostomus trimarianus, Martens.

Hab.: Islas Tres Marías. B. C. A., p. 216.

Otostomus hepatostomus, Martens.

Etim.: O. boca color de hígado. Gr. *Ἒπαρ*, *Ἒπατός*, hígado; *στόμα*, boca; correctamente, hepatostoma.

Sin.: *Bulimus hepatostomus*, Pfr.; *Bulimulus (drymæus) hepatostomus*, F. et C.

Hab.: Tepanistlahuaca, Juquila (Oax.), Tacubaya. M. C. G. E.

Otostomus dronetii, Martens.

Sin.: *Bulimus dronetii*, Pfr.; *Bulimulus (scutalus) dronetii*, F. et C.; *Bulimulus dronetii*, Streb.; *Bulimulus (scutalus) sporlederi*, Streb.; *Otostomus (scutalus) sporlederi*, Martens.

Hab.: Pacho, Molino de Padre Guerra; Barranca de Mahuistlán; San José Miahuatlán, Jalapa, Mirador, Orizaba, Córdoba, Túxpam, Atoyac. B. C. A., p. 218.

Otostomus inglorius, Martens.

Sin.: *Bulimus inglorius*, Reeve; *Bulimus (mesembrinus) inglorius*, Pfr.

Variedad: *heynemanni*.

Bulimus heynemanni.

Hab.: Orizaba, Tecomavaca, Puebla, Cerro de San Andrés de la Cal (Oax.), Tlacolula. B. C. A., p. 219.

Otostomus totonacus, Martens.

Sin.: *Bulimulus totonaeus*, Streb.

Hab.: Ranchos de Quilate y Agua Caliente, cerca de Misantla. B. C. A., p. 221.

Otostomus emeus, Martens.

Sin.: *Bulimus emens*, Say; *Bulimus mexicanus*, Reeve; *Bulimulus (liostracus) mexicanus* var. B, *gracilior*, Reeve (1); *Bulimus ziegleri*, Reeve; *Bulimulus (thaumastus) tryoni*, F. et C.; *Bulimus baezensis*, Pfr.; *Bulimulus palpaloensis*, Streb.; *Bulimulus (liostracus) alternans*; *Otostomus (drymæus) palpaloensis*, Mart.

Variedad: *hypozonus* (2).

- Bulimulus palpalensis**, Streb. **Otostomus tropicalis**, Martens.
c, albivaricosus (3). Sin.: *Bulimus tropicalis*, Morelet; *Bulimus (pyrgus) tropicalis*, Pfr.; *Bulimulus (liostracus) tropicalis*, Streb.
d, membranacens (4). Hab.: Yucatán, Campeche, Tabí, Sur de Mérida, Ruinas de Labua. B. C. A., p. 233.
- Otostomus (mormus) membranacens**, Str. **Otostomus uhdeanus**, Martens.
Hab.: Papantla, Misantla; Quilate, Arroyo del Obispo; (1) Camino de Arroyo Hondo, Rancho de Guerrero, cerca de Misantla; Nautla; Molino de Pedreguera; Coatepec; Dos Arroyos; Pacho; Cuautitlán, Jalapa; Córdoba, Atoyac; Teapa (Tab.); (2) Jalapa y Córdoba; (3) Playa Vicente; (4) Mirador. B. C. A., p. 222. Sin.: *Bulimulus (mesembrinus) uhdeanus*; *Bulimulus (-entalus) uhdeanus*. F. et C.
Variedad: *cuernavacensis* (1).
- Otostomus sulfureus**, Martens. Bulimulus (*scutalus*) cuernavacensis.
Etim.: O. azufrado. *Sulphureus*, azufrado. Variedad: *tepicensis* (2).
Sin.: *Bulimus sulfureus*, Pfr.; *Bulimus moricandi*, Pfr.; *Bulimulus (drymæus) sulphureus*, Mart. Variedad: *borealis* (3).
Hab.: Aculeingo (Ver.), Sayula (Jal.); (1) Cuernavaca, Orizaba, Maltrata; (2) Tepic (Jal.), Ventanas (Dgo.). B. C. A., p. 233.
- Otostomus multilineatus**, Martens. **Otostomus heterogeneus**, Martens.
Hab.: Alrededores de la ciudad de México; Consolapa; Soncoautla, cerca de Jalapa; Mirador, Atoyac, Córdoba; Teapa (Tab.); (a) Jalapa, (b) Huatusco (Ver.). B. C. A., p. 225. Sin.: *Bulimus (liostracus) heterogeneus*.
Hab.: Tepic (Jal.); Mirador; Palo Grande, camino de Veraeruz á Jalapa; Rineonada (Ver.). B. C. A., p. 235.
- Género Amphibulimus**, Montfort, 1810. **Simpulopsis aenea**, Martens.
Subgénero *Simpulopsis*, Beck, 1837. Etim.: Voz híbrida del latín *simpulum*, vaso ó cáliz de madera ó barro con que se hacían las libaciones en los sacrificios; y del gr. ἄφη, ὅφις, aspecto.
Hab.: Chiapas, Yucatán. B. C. A., p. 227. Sin.: *Cylindrella ghiesbreghti*, Pfr.
Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 253.
- Simpulopsis cunninggi**, Martens. **CYLIDRELLIDÆ**.
Hab.: México B. C. A., p. 253. Etim.: Gr. κύλιρδος, cilindro; latín *cylindrus* y el diminutivo *idæ*. *Cylindrellidæ*, familia americana de moluscos gasterópodos pulmonados.
- Género Macroceramus**, Guilding, 1828. **Macroceramus concisus**, Martens.
Etim.: Gr. μακρός, largo, grande; κέραμος, vasija; latín *concisus*, cortado, partido. Olla grande de partida.
Hab.: Tehuacán, Tecomavaca, Puebla, Chilpancingo. B. C. A., p. 228. Sin.: *Cylindrella concisa*, Morelet; *Macroceramus polystreptus*, Tristan.
Variedad: *mexicanus* (a).
Macroceramus pontificus, Streb.
- Otostomus alternans**, Martens. **Hab.: Yucatán, varias localidades; (a) Sayula (Jal.), Orizaba, Atoyac; Arroyo Grande, Misantla.**
- Etim.: Bulimulus *virgulatus*, Tristan; *Bulimus alternans*, var. *B*; *Bulimulus (liostracus) alternans*; *Bulimulus (liostracus) mexicanus*. **Macroceramus concisus**, var. *Arctispirus*.
Hab.: Juquila, Oaxaca. B. C. A., p. 230. **Macroceramus gossei**, Aney.
Otostomus tryoni, Martens. **Hab.: Yucatán. B. C. A., p. 637.**
- Sin.: *Bulimus mexicanus*, Reeve; *Bulimulus (thaumastus) tryoni*; *Drymæus mexicanus*, Tryon. **Variedad: pochutlensis**.
- Bulimulus tryoni, var. *B* pochutlensis.
- Hab.: Pochutla, cerca de Chilapa (Guerrero). B. C. A., p. 232.

Macroceramus denticulatus, F. et C.Sin.: *Cylindrella articulata*, Pfr.

Hab.: México B. C. A., p. 289.

Macroceramus texanus

Hab.: Monterrey, N. L.

Género *Bifidaria*.**Bifidaria prototypus**.

Hab.:

Bifidaria servilis.

Hab.:

PUPIDÆ.Género *Pupa*, Draparnaud, 1805.**Pupa ovata**, Martens.Etim.: Latin *pupa*, muñeca; *ovata*, ovalada.Sin.: *Pupa* (*Vertigo*) *ovata*, Say; *Vertigo ovata*, Binney; *Isthmia ovata*, Morse; *Pupa modesta*, Say.

Hab.: Veracruz. B. C. A., p. 327.

Subgénero *Leucoachila*, Martens, 1861.**Pupa contracta**, Say.Sin.: *Leucoachila contracta*, Morse; *Pupa deltostoma*, Küster.

Hab.: Orizaba, Yautepec. B. C. A., p. 327.

Pupa pellucida (Pfr.).Sin.: *Vertigo* (*Alæa*) *pellucida*, Pfr.; *Leucoachila pellucida*, Pfr.; *Pupa servilis*, Gould; *Pupa rusei*, Pfr.; *Pupa pazi*, Hidalgo; *Pupa* (*leucoachila*) *wolffi*, Miller.

Hab.: Veracruz, Yautepec (Morelos), San Juan Bautista (Tab.), Sisal, Mérida (Yuc.). B. C. A., p. 328.

Pupa albilabris, Adams.Sin.: *Pupoides marginatus*; *Cyclostoma marginatum*, Say; *Bulimus marginatus*; *Leucoachila marginata*.

Hab.: México B. C. A., p. 329.

Pupa (leucoachila) chordata, Martens.Sin.: *Bulimus chordatus*; *Pupoides chordatus*.

Hab.: Mazatlán. B. C. A., p. 330.

Pupoides marginatus.Hab.: Topo Chico, N. L. Véase *Pupa albilabris*.Género *Holospira*, E. von Martens, 1860.(Fam. *Cylindrellidæ*. Gén. *Holospira*. B. C. A.).**Holospira imbricata**, F. et C.Etim.: Gr. $\delta\lambda\sigma$, todo, completamente; $\sigma\pi\iota\rho\alpha$, espiral. Lat. *imbricatus*, imbricado, en figura de teja.Sin.: *Cylindrella* (*holospira*) *imbricata*, v. Martens.

Hab.: México M. S. M., p. 336; B. C. A., p. 273.

Holospira tryoni, Martens.Sin.: *Cylindrella tryoni*, Pfr.; *Bostrichocentrum tryoni*, Streb.; *Holospira gealei*, F. et C.

Hab.: Matamoros Izúcar, Pueb.

Variedad: *gealei*.

Hab.: Matamoros Izúcar, Pueb.; Putla, Oax.

Variedad: *apressa*.

Hab.: Matamoros Izúcar, Pueb. B. C. A., p. 276.

Holospira claviformis, sp. n. Martens.Etim.: Lat. *clavus*, clavo; *forma*, en forma de.Sin.: *Cylindrella pilocerei*, Son.

Hab.: Amula, cerca de Tixtla, Gro. B. C. A., p. 277.

Holospira microstoma, Martens.Etim.: *Holospira* boca pequeña. Gr: *μικρός*, pequeño; *στόμα*, boca.Sin.: *Cylindrella microstoma*, F. et C.

Hab.: México B. C. A., p. 278.

Holospira pilocerei, F. et C.Etim.: *Pilocereus* es el nombre de un género de cácteas. Voz híbrida, de *πῖλος*, sombrero; *cereus*, cirio, vela, ó *cereus*, de cera; sombrero de cera.Sin.: *Cylindrella pilocerei*, Pfr.

Hab.: Cuautla de las Amilpas (Pueb.), México B. C. A., p. 278.

Holospira cretacea, F. et C.Sin.: *Cylindrella cretacea*, Pfr.

Hab.: México B. C. A., p. 279.

Holospira coahuilensis, F. et C.Sin.: *Cylindrella coahuilensis*, Binney; *Gonystoma coahuilensis*, Tryon.Variedad: *semisculpta* (1).

Hab.: Ciénega Grande (Coah.), (1) Cañón de San Carlos (Chih.). B. C. A., p. 279.

Holospira remondi, Martens.Sin.: *Cylindrella remondi*, Tryon.

Hab.: Asivechi, Valle de Sahuaripa (Son.). B. C. A., p. 279.

Holospira teres (F. et C.).Sin.: *Cylindrella teres*, Menke.Variedad: *minor* (1).Variedad: *högeana* (2).

Hab.: Estado de Puebla, (1) Puebla, (2) Maltrata (Ver.). B. C. A., pp. 279 y 280.

Holospira pfeifferi, Tryon.Sin.: *Cylindrella pfeifferi*, Menke.Variedad: *minor* (1).Variedad: *minima* (2).

Hab.: Tehuacán, Pueb.; (1) Cerro de la Campana, cerca de Hermosillo (Sonora); (2) México B. C. A., p. 280.

Holospira goniostoma, F. et C.

- Etim.: Gr. *γωνία*, angulo; *στόμα*, boca.
 Sin.: Cylindrella goniostoma, Pfr.
 Hab.: México..... B. C. A., p. 280.
- Holospira fusca**, sp. n. Martens.
 Etim.: Holospira morena. Latín *fuscus*, moreno.
 Hab.: Omilteme (Gro.). B. C. A., p. 280.
- Holospira berendti**, Martens.
 Sin.: Cylindrella berendti, Pfr.; Epirobia berendti, Streb.
- Variedad: *albida* (a).
 Hab.: Túxpam, Montaña Matlaquiahuitl, Córdoba, (a) Chiapas. B. C. A., p. 281.
- Subgénero *Epirobia*, Streb.
- Holospira gassiesi**, Martens.
 Sin.: Cylindrella gassiesi, Pfr.
 Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 283.
- Holospira apiostoma**, Martens.
 Etim.: Gr. *ἀπιόν*, pera; *στόμα*, boca.
 Sin.: Cylindrella apiostoma, Pfr.
 Hab.: Córdoba. B. C. A., p. 283.
- Holospira swiftiana**, Martens.
 Hab.: México? B. C. A., p. 284.
- Holospira speluncæ**, Martens.
 Etim.: Holospira de las cavernas. Lat. *spelunca*, caverna.
 Sin.: Cylindrella costulata, Morelet; Cylindrella speluncæ, Pfr.
 Variedad: *dubia* (a).
 Hab.: Cueva de Tabí, Ticul, (a) Labna, Yuc. B. C. A., p. 284.
- Holospira polygyra**, Martens.
 Etim.: Gr. *πολύ*, mucho; *γυρά*, vuelta.
 Sin.: Cylindrella polygyra, Pfr.; Epirobia polygyra, Streb.
 Hab.: Córdoba. B. C. A., p. 284.
- Holospira morini**, Martens.
 Sin.: Cylindrella morini, Morel.
 Hab.: Montes Poana (Tab.). B. C. A., p. 285.
- Holospira veracruziana**, Martens.
 Hab.: Misantla. B. C. A., p. 635.
- Holospira pilsbry**, Martens.
 Hab.: Puebla. B. C. A., p. 636.
- Género *Eucalodium*, C. et F., 1868.
 (Fam. Cylindrellidæ. B. C. A.).
- Eucalodium ghiesbreghti**, C. et F.
 Etim.: Gr. *εὖ*, bien; *καλός*, bello; diminutivo, *καλοθιον*. Dedicado al naturalista Ghiesbreght. M. Fischer da como etimología *καλοδιον*, cuerda.
 Sin.: Cylindrella ghiesbreghti, Pfr.
 Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 255.
- Eucalodium blandianum**, F. et C.
 Sin.: Cylindrella speciosa, Sow.; Cylindrella blandiana, Pfr.
 Hab.: Montañas cerca de Orizaba, San Juan Miahuatlán, Coatepec. B. C. A., p. 258.
- Eucalodium sumichrasti**, Martens.
 Hab.: Estado de Chiapas. B. C. A., p. 633.
- Eucalodium walpoleanum**, C. et F.
 Sin.: Cylindrella walpolei, Sowerby.
 Hab.: Bosques de Palenque, Chiapas. B. C. A., p. 259.
- Eucalodium insigne**, Martens.
 Sin.: Cylindrella insignis, Pfr.
 Hab.: México. B. C. A., p. 259.
- Eucalodium decollatum**, Martens.
 Etim.: Eucalodio degollado. Lat. *decollatum*, degollado.
 Sin.: Pupa decollata, Nysten; Cylindrella decollata, Pfr.
 Hab.: Tabasco. B. C. A., p. 260.
- Eucalodium compactum**, Martens.
 Hab.: Tabasco. B. C. A., p. 260.
- Eucalodium mexicanum**, Martens.
 Sin.: Cylindrella mexicana, Pfr.
 Variedad: *minor* (1); var. *B*; F. et C.
 Hab.: Tabasco, Chiapas, (1) Jaquila (Oax.). B. C. A., p. 260.
- Eucalodium grande**, F. et C.
 Sin.: Cylindrella grandis, Pfr.
 Hab.: Juquila (Oax.). B. C. A., p. 261.
- Eucalodium splendidum**, Martens.
 Sin.: Cylindrella splendida, Martens.
 Hab.: Zacatepec (Oax.). B. C. A., p. 261.
- Eucalodium decurtatum**, Martens.
 Etim.: Eucalodio acortado. Latin *decurtatus*, acortado.
 Sin.: Cylindrella (urocoptis) decurtata, H. Adams.
 Hab.: Putla (Oax.). B. C. A., p. 261.
- Eucalodium densecostatum**, Martens.
 Hab.: Orizaba. B. C. A., p. 261.
- Eucalodium speciosum**, Martens.
 Etim.: Eucalodio vistoso. Latin *speciosus*, vistoso.
 Sin.: Cylindrella speciosa, Dunk; Eucalodium boucardi, F. et C.
 Variedad: *boucardi* (a).
 » *strebli* (b).
 » *minimum* (c).
 » *fischeri?* (d).
 Hab.: Córdoba, Coatepec, Jalapa, Cuesta de Misantla, (a) Córdoba, Orizaba, (b) Chirimoyo, Noalingo, alrededores de Jalapa, (c) Córdoba, Atoyac, (d) Chiquihuitl (Ver.). B. C. A., p. 261.
- Eucalodium edwardsianum**, Martens.

- Sin.:** Cylindrella edwardsiana.
Hab.: Córdoba, Agua Caliente, Hirial, Nacimiento de Quilate (Misantla). B. C. A., p. 262.
- Eucalodium deshayesianum,** Martens.
Sin.: Cylindrella deshayesiana.
Hab.: Chiapas ó Tabasco. B. C. A., p. 263.
- Eucalodium cereum,** Martens.
Etim.: Eucalodio color de cera. Lat. *cereum*, color de cera.
Hab.: San Antonio del Monte, camino de Misantla, Coatepec. B. C. A., p. 263.
- Eucalodium moussonianum,** Martens.
Sin.: Cylindrella decollata, var. *B*; Cylindrella speciosa, Dunker; Eucalodium boucardi, var. *B*, F. et C.
Hab.: Estado de Veracruz. B. C. A., p. 263.
- Eucalodium neglectum,** Martens.
Etim.: Eucalodio de poco interés. Latín *neglectum*, de poco interés.
Sin.: Cylindrella neglecta, Pfr.
Hab.: Oaxaca. B. C. A., p. 263.
- Eucalodium truncatum,** Martens.
Sin.: Bulimus truncatus, Pfr.; Cylindrella truncata, Pfr.; Eucalodium martensi, Streb.
Hab.: Angangueo (Mich.), Omilteme (Gro.), México. B. C. A., p. 264.
- Eucalodium recticosta,** Martens.
Sin.: Cylindrella recticosta, Pfr.
Hab.: Culata, cerca de Manzanillo (Colima), Oaxaca, México B. C. A., p. 265.
- Eucalodium strebeli,** Martens.
Hab.: Cerro de Plumas, cerca de Puerto Angel (Oax.). B. C. A., p. 265.
- Eucalodium liebmani,** Martens.
Sin.: Cylindrella liebmani, Pfr.; Anisospira liebmani, Streb.; Cylindrella trocheiformis.
Hab.: Barrio y Juchitán, Istmo de Tehuantepec, México B. C. A., p. 266.
- Eucalodium hypocastanum,** Martens.
Hab.: San Sebastián (Jal.). B. C. A., p. 633.
- Eucalodium hyalinum,** Martens.
Sin.: Cylindrella hyalina, F. et C.; Anisospira hyalina.
Hab.: Oaxaca, Tabasco. B. C. A., p. 266.
- Eucalodium dalli,** Martens.
Sin.: Anisospira strebeli.
Hab.: Huilotepec (Oax.). B. C. A., p. 633.
- Subgénero *Cælocentrum*, F. et C., 1872.
- Cælocentrum turris,** Martens.
Etim.: Gr. *κοῖλος*, hueco; *κέντρον*, centro. Latín *turris*, torre.
Sin.: Cylindrella turris; Eucalodium turris.
Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 270.
- Cælocentrum clava,** Martens
Etim.: Latín *clava*, palo de un metro de largo, que desde la empuñadura va engrosando hasta terminar en una como cabeza llena de puntas. Maza ó basto.
Sin.: Cylindrella clava, Pfr.; Eucalodium clava, F. et C.
Variedad: *rufescens*.
Hab.: Chiapas. México B. C. A., p. 270.
- Cælocentrum tomacella,** Martens.
Etim.: C. butifarra. Latín *tomacella*, *tomaculum*, *tomaima*, butifarra ó salchichón.
Sin.: Cylindrella tomacella; Cylindrella moreleti, Desh.
Hab.: Bosques de Tabasco y minas de Palenque, Chiapas. B. C. A., p. 271.
- Cælocentrum arctispira,** Martens.
Etim.: C. de espiras angostas. Latín *arctus*, estrecho, angosto.
Sin.: Cylindrella arctispira.
Hab.: Quilate, Agua Caliente, Arroyo del Banco, alrededor de Misantla; Istapa (Tab.), Juquila (Oax.), Jalapa. B. C. A., p. 271.
- Cælocentrum crosseanum,** Martens.
Sin.: Eucalodium crosseanum; Cylindrella crossea, Pfr.
Hab.: Orizaba; Cuautlatlán, entre Jico y Perote. B. C. A., p. 272.
- Cælocentrum filicosta,** Martens.
Sin.: Cylindrella filicosta; Eucalodium filicosta.
Hab.: Córdoba, montes alrededor de Orizaba. B. C. A., p. 272.
- Cælocentrum acanthophora,** Martens.
Etim.: Gr. *ἄκανθα*, espina; *φορός*, el que lleva.
Hab.: Encarnación (Hgo.). B. C. A., p. 634.
- Cælocentrum nelsoni,** Martens.
Hab.: Tuxtla. B. C. A., p. 634.
- Cælocentrum pfeifferi,** Martens.
Hab.: Ocozocoautla, Chiapas. B. C. A., p. 634.

STENOZYRIDÆ.

Comprende tres subfamilias: Achatininæ, Stenogyrinæ y Cœcilianellinæ. Etim.: Gr. *στενός*, estrecho; *γύρων*, yo giro.

Género *Stenogyra*, Schuttleworth, 1854.

Subgénero *Opeas*, Albers, 1850.

Opeas subula (F. et C.).

Etim.: Gr. *όπέας*, lezna, lo mismo que en latín, *subula*, lezna.

Sin.: Achatina subula, Pfr.; Bulimus subula, Pfr.; Stenogyra subula, Schuttleworth.

Hab.: Veraeruz, Paso del Macho (Ver.), Sayula (Jal.), Tapana y Cacoprieto, Istmo de Tehuantepec, Chiapas, San Juan Bautista (Tab.). B. C. A., p. 291.

Opeas rarum, Miller.

Hab.: Mirador. B. C. A., p. 292.

Martens supone que son especies jóvenes de *O. subula*.

Opeas colimense, Martens.

Sin.: *Stenogyra colimensis*, F. et C.; *Bulimus colimensis*, Pfr.

Hab.: Córdoba, Colima, S. Juan Bautista (Tab.). B. C. A., p. 293.

Opeas octonoides, Strebcl.

Etim.: O. en forma de ocho. Gr. ὄκτο, ocho; εἴδες, forma.

Sin.: *Bulimus octonoides*, Adams; *Stenogyra octonoides*, Binney; *Bulimus contractus*, Poey.

Hab.: Antigua (Ver.). M. C. G. E., núm. 611.

Opeas micra, Martens.

Etim.: O. pequeño. Gr. μικρός, pequeño.

Sin.: *Helix micra*, d'Orbigny; *Bulimus micra*, d'Orbigny; *Opeas costostriatus*, Pfr.; *Opeas caraccaceensis*, Strebcl; *Synopeas caraccacensis*, Biolley.

Variedad: *caraccacensis* (a).

Hab.: Agua Caliente, camino de Arroyo Hondo; Ranchos del Eligio y de Guerrero, camino del Obispo, cerca de Misantla; Teapa y San Juan Bautista (Tab.); (a) Veraeruz, Córdoba, Orizaba, Dos Arroyos, Barranca de Mahuistlán, Pacho, Mirador, Chiapas, Teapa (Tab.), San Carlos (O. de Oax.). B. C. A., p. 294.

Opeas? semistriatum, Martens.

Hab.: Palenque. B. C. A., p. 296.

Opeas patzcuarensis, Martens.

Hab.: Pátzcuaro (Mich.). B. C. A., p. 638.

Opeas odiosum, Martens.

Hab.: Pátzcuaro (Mich.). B. C. A., p. 638.

Opeas rhoadsæ, Martens.

Hab.: Diente (Monterrey, N. L.). B. C. A., p. 638.

(Género *Stenogyra*).

Subgénero *Spiraxis*, C. B. Adams, 1850.

Spiraxis sulciferus, F. et C.

Etim.: Latin *spira*, espira, línea curva á modo de caracol; *axis*, el eje de la esfera, toda línea que atraviesa por el centro de un círculo ó de una espira. *Espiraje sulcoso*; latin *sulcus*, surco; gr. φέρω, yo llevo, voz híbrida; significa tener surcos ó depresiones longitudinales.

Sin.: *Bulimus sulciferus*, Morelet; *Volutaxis sulciferus*, Strebcl; *Spiraxis euptictus*, Pfr.

Variedad: *berendti* (a).

Hab.: Ranchos de Guerrero, San Eligio y Agua Caliente, cerca de Misantla; Mirador, Palenque, Chiapas; (a) Mirador, Cañada grande de Coatepec, cerca de Jalapa. B. C. A., p. 308.

Spiraxis tenuis, Pfr.

Hab.: Orizaba. B. C. A., p. 309.

Spiraxis acus, Schuttleworth.

Etim.: Latin *acus*, aguja.

Sin.: *Volutaxis acus*, Strebcl.

Variedad: *minor* (a).

Hab.: Córdoba, (a) Orizaba.

Spiraxis tenuecostatus, Martens.

Etim.: E. de costillas delgadas. Latin *tenue*, fino; *costatus*, que tiene costillas.

Sin.: *Volutaxis tenuecostatus*, Strebcl.

Hab.: Agua Caliente, cerca de Misantla. B. C. A., p. 309.

Spiraxis miradorensis, Martens.

Sin.: *Volutaxis miradorensis*, Strebcl.

Hab.: Mirador. B. C. A., p. 309.

Spiraxis similaris, Martens.

Sin.: *Volutaxis similaris*, Strebcl.

Hab.: Bosque de Pacho (Jal.), San Rafael, Sicaltepec. B. C. A., p. 310.

Spiraxis confertecostatus, Martens.

Etim.: E. de costillas apretadas. Latin *confer-te*, apretado; *costatus*, con costillas.

Sin.: *Volutaxis confertecostatus*, Strebcl.

Hab.: Pacho y Dos Arroyos (Jalapa). B. C. A., p. 310.

Spiraxis intermedius, Martens.

Sin.: *Volutaxis intermedius*, Strebcl.

Hab.: Pacho (Jal.). B. C. A., p. 310.

Spiraxis confertestriatus, Martens.

Etim.: E. con estrías estrechas. Latin *confer-te*, estrechamente; *striatus*, con rayas.

Sin.: *Volutaxis confertestriatus*, Strebcl.

Hab.: Mirador.

Spiraxis nitidus, Martens.

Sin.: *Volutaxis nitidus*, Strebcl.

Variedad: *major* (a).

> *minor* (b).

Hab.: Pacho, Mirador, (a) Las Vigas, (b) Pacho, camino del Obispo, Mirador. B. C. A., p. 310.

Spiraxis linearis, Pfr.

Sin.: *Volutaxis linearis*, Strebcl.

Hab.: Veraeruz. B. C. A., p. 311.

Spiraxis blandi, Martens.

Hab.: E. de Veraeruz. B. C. A., p. 311.

Spiraxis uruapamensis, Martens.

Hab.: Uruápam (Mich.). B. C. A., p. 639.

Spiraxis berendti, Pfr.

Hab.: México Dr. P. Fischer. Man. de Conchil., p. 452.

Nota.—Este molusco pertenece más bien al subgénero *Volutaxis*, Gén. *Pseudosubulina*, Fam. *Testacellidae*.

Subgénero *Leptinaria*, Beck, 1837.

Leptinaria mexicana, Martens.

Etim.: Gr. λεπτός, delgado.

Sin.: *Spiraxis mexicana*, Pfr.; *Lamellaxis mexicana*, Streb.; *Nothus mexicanus*, Ancey.

Variedad: *turrita* (a).

» *abbreviata* (b).

Hab.: Mirador, Ranchos Guerrero y San Eligio, Agua Caliente, caminos del Obispo y Arroyo Hondo (Misantla), Cañada de Coatepec, Misantla; (a) Agua Caliente, Misantla; (b) Mirador, Agua Caliente. B. C. A., p. 316.

Leptinaria martensi, Mart.

Sin.: *Bulimus martensi*, Pfr.; *Spiraxis martensi*, F. et C.; *Lamellaxis modestus*, B., Streb.

Variedad: *inflata* (a).

Hab.: Córdoba, Mirador, (a) Misantla. B. C. A., p. 316.

Leptinaria exigua, sp. n.

Hab.: Teapa, Tab. B. C. A., p. 318.

Leptinaria imperforata, Mart.

Sin.: *Lamellaxis imperforata*, Streb.

Hab.: Jalapa. B. C. A., p. 320.

Subgénero *Subulina*, Beck, 1837.

Subulina octona, Mart.

Etim.: Latín *subula*, lezna.

Sin.: *Helix octona*, Chemnitz; *Bulimus octonus*, Brug.; *Achatina octona*, Gray, *Stenogyra (subulina) octona*, Schuttl.; *Tira octona*, Schmidt.

Variedad: *strebli* (a).

Subulina trochlea, Streb.

Variedad: *trochlea* (b).

Achatina trochlea, Pfr.

Hab.: Veracruz, Teapa (Tab.), (a) Campeche, (b) Teapa, Mérida, Izamal (Yuc.). B. C. A., p. 298.

Subulina porrecta, sp. n.

Sin.: *Subulina trochlea*, Pfr.

Hab.: Teapa (Tab.). B. C. A., p. 300.

Subulina rangiana, F. et C.

Sin.: *Achatina rangiana*, Pfr.

Hab.: México..... B. C. A., p. 300; M. S. M., p. 638.

Género *Oryzosoma*.

Oryzosoma tabiense, Mart.

Etim.: ὄρυξα, arroz; σῶμα, cuerpo.

Sin.: *Streptostyla tabiense*, Pilsbry.

Hab.: Montes en la Hacienda Tabí (Yuc.). B. C. A., p. 640.

Nota.—Colocamos esta especie en este lugar por indicar Martens en la Biología que debe ir al lado del género *Cæcilianella*.

Género *Cæcilianella*, Féussac, en 1817.

Cæcilianella veracrucensis, Mart.

Etim.: Latin *cæcus*, ciego; cieguecita.

Sin.: *Achatina iota*.

Hab.: Veracruz. B. C. A., p. 324.

SUCCINEIDÆ.

(Fam. *Elasmognatha*. B. C. A.).

Género *Succinea*, Draparnaud, 1801.

Succinea luteola (A. Gould), Mart.

Etim.: Latin *succineus*, succino; *luteus*, lo que es de lodo, barro, etc., y también rojo, amarillo, rubio. *Succinea rubia* ó enlodada.

Sin.: *Succinea texasiana*, Pfr.

Variedad: *subtilis* (a).

» *rudiuscula* (b).

Hab.: Tamaulipas, Venta de Zopilote (Gro.), Progreso (Yuc.), Lago de Palomas, Valle de los Mimbres (Chih.), (a) Veracruz, (b) Tehuacán. B. C. A., p. 331.

Succinea virgata, v. Mart.

Etim.: S. listada. Latin *virgatus*, listado, rayado.

Variedad: *högeana* (a).

» *microspira* (b).

Hab.: Veracruz, Sierra de Atoyac, Paso del Macho, Tehuacán, Oaxaca (b), Puebla. B. C. A., p. 334.

Succinea undata, Mart.

Sin.: *Succinea petiti*, Beck; *Succinea oblicua*, Say.

Variedad: *mærchi* (a).

Hab.: Méjico Irapuato, cerca del Río Lerma; Sayula (Jal.); Santecomapam, cerca de Tuxtla; (a) Zimapam, Hgo. B. C. A., p. 335-36.

Succinea colorata, Mart.

Sin.: *Succinea undulata*, var. *colorata*, F. et C.

Hab.: San Juan Bautista, Tab. B. C. A., p. 336.

Succinea campestris, Say.

Sin.: *Succinea inflata*, Lea.

Hab.: Lago de Texcoco. B. C. A., p. 337.

Succinea pueblensis, Mart.

Sin.: *Succinea aurea*, Lea.

Hab.: Puebla. B. C. A., p. 338.

Succinea brevis, Mart.

Hab.: Zimapam, Hgo. B. C. A., p. 339.

Succinea sallleana, Mart.

Variedad: *cordobana* (a).

Hab.: Región de «Tierra Fría,» Ver.; (a) Córdoba. B. C. A., p. 339.

Succinea ampullacea, sp. n. Mart.

Hab.: Ameca (Jal.). B. C. A., p. 340.

Succinea tlalpamensis, Pilsbry.

Variedad: *cuitzeana* (a).

Hab.: Tlálepam, (a) Lago de Cuitzeo, cerca de Huango. B. C. A., p. 642.

Succinea guatemalensis, Mart.

Hab.: Tabasco. B. C. A., p. 641.

Especies dudosas. B. C. A.

Succinea concordalis, A. Gould.

Hab.: Túxpam, Ver.

Succinea undulata.

Var. *carmenensis*.

Hab.: Isla del Carmen.

Succinea lineata, var. *sonorensis*.

Hab.: Río Yaqui (Son.).

Sucinea cingulata, Forbes.

Hab.: Mazatlán.

VAGINULIDÆ.

(Fam. Veronicellidæ. B. C. A.).

Género *Veronicella*, Blainville, 1817.

Veronicella mexicana, Mart.

Sin.: *Vaginulus mexicanus*, Pfeiffer.

Hab.: México B. C. A., p. 350.

Veronicella moreleti, Mart.

Sin.: *Vaginula moreleti*, C. et F.

Hab.: Cacoprieto, Istmo de Tehuantepec, Palenque, Isla del Carmen. B. C. A., p. 350.

Género *Metostracon*.

Metostracon mima, Mart.

Hab.: Morelia, Uruápam. B. C. A., p. 642.

SUBORDEN II. GEHIDROPHILA.

AURICULIDÆ.

Género *Carychium*, O. F. Müller, 1774.

Carychium exiguum.

Var. *mexicanum*, Pilsbry.

Etim.: Gr. *καρυχίον*, bocina, trompeta.

Hab.: Orizaba, San Juan Miahualtán. B. C. A., p. 352.

Género *Alexia*, Leach, 1847.

Alexia latrei.

Hab.: Xalapa. M. C. G. E., núm. 77.

Género *Tralia*, Gray, 1840.

Tralla pusilla, Guemelin.

Hab.:

Género *Blauneria*, Schuttleworth, 1854.

Blauneria heteroclita, F. et C.

Sin.: *Voluta heteroclita*, Montague.

Tornatellina cubensis, Pfr.; *Blauneria pellucida*, Pfr.

Hab.: Sisal (Yuc.). B. C. A., p. 563.

Género *Pedipes*, Adamson, 1757.

Pedipes angulatus, Pfr.

Hab.: Este género se halla representado en ambas playas de la República «all along both shores of Mexico.» B. C. A., p. 562.

SUBORDEN III. HIGROPHILA.

LIMNÆIDÆ.

Limnæa attenuata, Mart.

Etim.: Gr. *λίμνη*, estanque.

Sin.: *Omphicola pugio*, Beck.

Limnæus subulatus, Dunker.

Limnæus turritus, Philippi.

Limnæus mexicanus, Ziegler.

Limnæa emarginata, Sowerby.

Hab.: Alrededores de la Ciudad de México, Lago de México. Lago de Chaleo, Zimapam, Hgo. B. C. A., p. 375. Tlálpan.

Limnæa palmeri, Mart.

Hab.: Río Yaqui, S. de Guaymas (Son.). B. C. A., p. 377.

Limnæa cubensis, Mart.

Hab.: Veracruz, Río Tenoya (Orizaba). B. C. A., p. 378. Morelia.

Limnæa columela.

Hab.:

Limnæa desidiosa.

Hab.:

Limnæa refleja.

Hab.:

Género *Ancylus*, Geoffroy, 1767.

Ancylus sallaei, Bourguignat.

Etim.: Gr. *αγκύλος*, encorvado.

Hab.: Lago de Túxpam, cerca de Córdoba. B. C. A., p. 401.

Ancylus papillaris, sp. n. Mart.

N. c.: Ancílo papilar. Latín *papilla*, pezón.

Hab.: Río Ameca (Jal.), Monterrey, N. L. B. C. A., p. 402.

Ancylus excentricus, Morelet.

Sin.: *Veletia excentrica*, Tate.

Hab.: Slikolak, Yuc.; Uruápam (Michoacán). B. C. A., p. 402.

Ancylus haldemani.

Hab.: Monterrey, N. L.

Género *Planorbis*, Guettan, 1756.

Planorbis tenuis, Dunker.

Etim.: Planorbis, de *planus*, plano; *orbis*, círculo; *tenuis*, delgado.

Sin.: *Planorbis mexicanus*, Ziegler; *Planorbis fragilis*, Dunker.

Hab.: Durango, alrededores y Ciudad de México, Lago de Chaleo, Lago de Chapala (Jal.), Jaral (Gto.), Jalapa, Córdoba, Orizaba.

- Variedad: *boucardi* (a).
 » *juvenilis* (b).
 » *appalanatus* (c).
 » *uhdei* (d).
 » *exaggeratus* (e).
 » *strebilianus* (f).
- Planorbis ancylostomus**, var. *B*, *strebilianus*.
 Hab.: (a) Alrededores de México, Lago de Chalco; (b) alrededores de México; (c) Mesa Central; (d) México..... (e) Lago de Pátzcuaro; (f) Laguna de los Cocos, Río Tenoya (Ver.). B. C. A., p. 381.
- Planorbis tumens**, Mart.
 Etim.: P. hinchado. Lat. *tumens*, hinchado.
 Sin.: *Planorbis tenagophilus*, Menke.
 Hab.: Mazatlán (raro). B. C. A., p. 387.
- Planorbis caribœus**, d'Orbigny.
 Sin.: *Planorbis latus*, Say.
Planorbis tumidus, Pfr.
Planorbis glabratus, Haldeman.
Planorbis intermedius, Philippi.
Planorbis ancylostomus, C. et F.
 Hab.: Ojo de Agua, N. de México; Veracruz, Jalapa, Orizaba, Chiapas; Shkolak, Yue.
- Variedad: *minor*.
Planorbis capilaris, Beck.
 » *albescens*, Uhde.
 » *tumens*, Carpenter.
 » *guatemalensis*, Clesin.
 Hab.: Veracruz, Jalapa, San Bernardino y Río Sonoyta.
- Variedad: *chiapensis*.
Planorbis ancylostomus, var. *chiapensis*, F. et C.
 Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 387.
- Planorbis belizensis**, C. et F.
 Hab.: Tabasco. B. C. A., p. 390.
- Planorbis orbiculus**, Mart.
 Sin.: *Planorbis simplex*, Beck.
Planorbis haldemanii, Dunker.
Planorbis liebmani, Dunker.
Planorbis depressus, Dunker.
Planorbis micromphalus, Dunker.
 Hab.: Alrededores y Ciudad de México, San Carlos (Oax.), Veracruz, San Juan (Ver.), Balancan (Tab.), Palizada, Laguna de Términos, Isla del Carmen (Yuc.). B. C. A., p. 390.
- Planorbis maya**, Morelet.
 Hab.: Tehuantepec, Yucatán, Campeche. B. C. A., p. 392.
- Planorbis retusus**, Morelet.
 Etim.: P. tapado. Latín *retusus*, tapado.
 Sin.: *Planorbis planus*, Clesin.
- Hab.: Isla del Carmen, Shkolak (Yucatán).
 B. C. A., p. 393.
- Planorbis tepicensis**, sp. n.
 Hab.: Tepic (Jal.). B. C. A., p. 393.
- Planorbis petenensis**, Morelet.
 Hab.: Cacoprieto (Tehuantepec). B. C. A., p. 393.
- Planorbis parvus**, Say.
 Etim.: P. pequeño. Latín *parvus*, pequeño.
 Hab.: Yautepec, Morelos. B. C. A., p. 394.
- Planorbis sumichrasti**, C. et F.
 Hab.: Cacoprieto (Tehuantepec). B. C. A., p. 396.
- Planorbis subpronus**, sp. n.
 Etim.: *Planorbis semidoblado*, encorvado hacia adelante. Latín *sub*, algo; *pronus*, inclinado, doblado hacia adelante.
 Hab.: Amatitan, Tab. B. C. A., p. 396.
- Planorbis izabalensis**, C. et F.
 Hab.: Balancan, Tab. B. C. A., p. 397.
- Planorbis obstructus**, Mart.
 Etim.: P. tapado. Latín *obstructus*, tapado.
 Sin.: *Planorbula obstructa*, F. et C.; *Segmentina doubilli*, Tristan; *Planorbis berendti*, Tryon.
 Hab.: Quilate, cerca de Misantla; Orizaba, Veracruz, Río Tenoya; San Carlos, Oax.; Istmo de Tehuantepec; Ticul, Yue.; Isla del Carmen, márgenes del Río Grijalva. B. C. A., p. 398.
- Planorbis mexicanus** (Philippi).
Nota.—Martens cree que esta especie es el *P. caribœus* joven. B. C. A., p. 400.
- Planorbis trivolvis**, Say.
 Hab.: Puebla. Mus. C. G. E., núm. 93.

PHYSIDÆ.

(Fam. Limnæidæ. Gén. *Physa*. B. C. A.).
 Género *Physa*, Draparnaud, 1801.

Subgénero *Aplecta* ($\ddot{\alpha}\pi\lambda\epsilon\kappa\tau\sigma$, no trenzado).

Physa maugerae, Woodward.

Etim.: Gr. $\varphi\nu\sigma\alpha$, vejiga; Mauger, revolucionario francés.

Sin.: *Aplexa maugriæ*, Gray.

Physa nitens, var. Streb.

Hab.: Costa de Tabasco.

Variedad: *acutalis*.

Aplecta nitens, var. *B*, F. et C.

Hab.: Cazones, cerca de Papantla (Ver.). B. C. A., p. 354.

Physa aurantia, Sowerby.

Etim.: Ph. naranjada. Lat. *aurantius*, color de oro, naranjado.

Sin.: *Physa peruviana*, Gray.

Aplexa aurantia, Carp.

Bulimus aurantius, Binney.

- Aplecta aurantia**, F. et C.
Variedad: glandiformis (a).
 Hab.: Mazatlán, (a) Acapulco. B. C. A., p. 356.
- Physa nitens**, Philippi.
 Etim.: Fisa brillante. Lat. *nitens*, brillante.
 Sin.: *Aplexa suturalis*, Beck.
Bulimus nitens, Binney.
Physa conspiciua, Uhde.
Variedad: gracilenta.
 Hab.: San Juan, Veracruz, Jalapa, Yucatán, (a) Tejería, Ver. B. C. A., p. 357.
- Physa impluviata**, Morelet.
 Etim.: Fisa de color oscuro. Lat. *impluviatus*, lo que es de color oscuro.
 Sin.: *Aplecta impluviata*, F. et C.
Physa purpurostoma, Tristan.
Variedad: bocourtii (a).
Physa fuliginosa, Morelet.
 Hab.: Tabasco, (a) Palizada, Yuc. B. C. A., p. 358.
- Physa cisterina**, Morelet.
 Sin.: *Aplecta cisterina*, F. et C.
Variedad: minor.
 » *ventrosior*.
Physa stolli, Clesin.
 Hab.: Tabí, Mérida (Yuc.). B. C. A., p. 361.
- Subgénero *Stenophysa*.
- Physa princeps**, Philips.
Variedad: pallens.
 Hab.: Yucatán. B. C. A., p. 364.
- Physa elata**, A. Gould.
 Etim.: Fisa visible. Lat. *elatus*, visible, de *efferō*, sacar fuera.
 Sin.: *Aplexa elata*, Carpenter.
Bulimus elatus, Binney.
 Hab.: Mazatlán, Baja California. B. C. A., p. 364.
- Physa spiculata**, Morelet.
 Etim.: Fisa agujada. Lat. *spicula*, agujón.
 Sin.: *Aplecta spiculata*, F. et C.
Variedad: tapanensis (a).
 Hab.: Lagoon (Ver.), Mérida, Campeche (a), Tapaná, Tehuantepec, Frontera, San Juan Bautista; Tabí, Yuc.; Campeche. B. C. A., p. 366.
- Physa bullula**, Mart.
 Sin.: *Aplecta bullula*, F. et C.
 Hab.: Túxpam, Ver. B. C. A., p. 368.
- Subgénero *Alampetis*.
- Physa osculans**, Mart.
 Sin.: *Physa mexicana*, Streb. *Physa mexicana*, var. *conoidea*, F. et C.
 Hab.: Ciudad de México, Lago de Texcoco, San Angel, Yautepec, Puebla.
Variedad: mexicana.
- Hab.: Ciudad de México, en los tanques; Lago de Chaleo, Puebla, Jalacingo (Ver.).
Subvariedad: plicata.
Physa mexicana, var. *plicata*, F. et C.
 Hab.: Alrededores de México.
Subvariedad: tolucensis.
Physa mexicana, var. *tolucensis*, F. et C.
 Hab.: Toluca.
Variedad: coniformis.
Physa ventricosa, Uhde; *Physa mexicana*, var. *coniformis*, Streb.
Physa osculans, var. *patzcuarensis*, Pilsbry.
 Hab.: Pátzcuaro, Mich.
Variedad: boucardi.
Physa boucardi, F. et C.
 Hab.: Lago de México, Ciudad de México. B. C. A., p. 370.
- Physa berendti**, Dunker.
 Sin.: *Physa mexicana*, var. *minor*; *Physa mexicana*, var. *parva*; *Physa heterostropha*, Streb; *Physa squalida*, Morelet.
 Hab.: Guadalajara, Tepic, Ameca (Jal.), Masantla, Río Colipa, Río de Octopam, Jalapa, Almolonga, Veracruz, Lago de los Cocos, Orizaba, Istmo de Tehuantepec, Tabasco.
Variedad: minima.
Physa mexicana, var. *minima*, v. Mart.
Physa ovalis, Wiegmann.
 Hab.: Tepic, Jalapa, Orizaba.
Variedad: lacustris.
Physa lacustris, Clesin.
 Hab.: Lago de Coatepec, Texolo, Ver.
Variedad: intermedia.
Physa berendti, var. *intermedia*, F. et C.
 Hab.: Putla (Oax.). B. C. A., p. 372.
- Physa squalida**, Morelet.
 Hab.: Balancan, ribera del Usumacinta. B. C. A., p. 373.
- Physa strebeli**, C. et F.
 Hab.: Veracruz. B. C. A., p. 373.
- Physa tehuantepensis**, F. et C.
 Hab.: Istmo de Tehuantepec. B. C. A., p. 374.
- Physa oscularis**; var. *rhysa*; Mart.
 Hab.: Saltillo (Coah.); Lago Palomas, en el valle de los Mimbres. B. C. A., p. 643.

SUBORDEN IV. THALASSOPHILA, Gray, 1850.

SIPHONARIIDÆ.

Género *Siphonaria*, Sowerby, 1824.**Siphonaria gigas**: Sow.Etim.: Gr. *σιφών*, sifón.

Hab.: G. de California. Dall. M. S. M., T. II, p. 107.

Siphonaria pica, Sow.

Hab.: Acapulco. M. S. M., T. II, p. 107.

Siphonaria equilirata, Carp.

Hab.: Mazatlán. M. S. M., T. II, p. 107.

Siphonaria lecanium, var. *palmata*, Philippi.

Hab.: Mazatlán. M. S. M., T. II, p. 107.

Siphonaria alternata, Say.Sin.: *Patella alternata*, Say; *Siphonaria truncata*, Jones.

Hab.: Yucatán.

Siphonaria lineolata, d'Orbigny.Sin.: *Siphonaria naufragam*, Stearns.

Hab.: Campeche.

Tribu Thalassophilos.

Fam. Gadiniidæ.

Gadinia, Gray, 1824.**Gadinia stellata**, Sow.

Hab.: G. de Cal.

Gadinia reticulata, Sow.Sin.: *Rowellia radiata*, Cooper.

Hab.: G. de California, Cabo San Lucas. M. S. M.

Subgénero *Liriola*, Dall, 1870.**Liriola peltoides**, Carp.

Hab.: Mazatlán.

Liriola subspiralis, Carp.

Hab.: G. de California.

ORDEN: OPISTOBANCHIATA,

Milne-Edwards, 1848.

Etim.: Gr. ὅπισθεν, detrás; βράγχια, agallas. Moluscos que tienen las agallas detrás del corazón.

SUBORDEN II. TECTIBANCHIATA.

Etim.: Moluscos que tienen las agallas cubiertas por el manto. Lat. *tectus*, cubierto; βράγχια, branquias.**ACTÆONIDÆ.***Actæon*.**Actæon exilis**, Jeffreys.

Hab.: N. del Atlántico á Campeche.

Actæon incisus, Dall.

Hab.: Fernandina á Yucatán.

BULLIDÆ.*Bulla*, Klein, 1753.**Bulla adamsi**, Menke.

Hab.: G. de California.

Bulla striata.

Hab.: Veracruz.

Género: *Haminea*.**Haminea guildingi**, Swainson.

Hab.: Desde Texas hasta Río Janeiro.

ORDEN: PROSOBRANCHIATA.

Etim.: Moluscos que tienen las branquias por delante del corazón. Gr. πρόσω, delante; βράγχια, branquias.

SUBORDEN I. PECTINIBANCHIATA.

Etim.: Moluscos que tienen las branquias en forma de peine. Voz híbrida; latín *pecten*, peine; βράγχια, branquias.**TEREBRIDÆ.**Gén. *Terebra*, Adamson, 1757.**Terebra tigrina**.Etim.: Lat. *terebra*, taladro, barreno; *tigrina*, atigrado.

Hab.:

Terebra dislocata, Say.

Hab.: Progreso, Yucatán.

Terebra cinerea, Bom.

Hab.: Veracruz, Progreso, Yucatán.

Terebra variegata, Gray.

Hab.: Veracruz y G. de California.

Terebra jamaicensis.

Hab.:

Gén.: *Euryta*, H. et A. Adams, 1853.**Euryta fulgurata**, Philips.

Hab.: G. de California.

CONIDÆ.Gén.: *Conus*, Linneo, 1758.**Conus princeps**, Linn.Etim.: Cono principe. Latín *conus*, cono; *princeps*, ncipe.Sin.: *Conus regius*, Chemnitz.

Hab.: G. de Cal. hasta Panamá, Mulegé, Golfo de Cortés.

Conus leoninus, Hwass.

Etim.: Cono leonino.

Hab.: Mulegé, Veracruz.

Conus interruptus, Hwass.

Etim.: Cono interrumpido.

Hab.: Acapulco, Mulegé.

Conus mus, Hwass.Etim.: Cono ratón. Latín *mus*, ratón.

Hab.: Playa de Veracruz.

Conus nux, Brodesip.

Etim.: Cono nuez. Latín *nux*, nuez.
Hab.: G. de California.

Conus lorenzianus, Chemnitz.

Etim.: Cono de Lorenzo.
Hab.: Costas de Acapulco. Kiener et Fischer.
Iconographie des Coquilles vivants. T. II, p. 139.

Conus gradatus, Gray.

Etim.: Cono escalera. Lat. *gradatus*, escalera.
Hab.: Costas de México. Kiener et Fischer,
l. c., p. 140.

Conus archon, Brodesip.

Etim.: Cono magistrado. Gr. *ἀρχόντης*, ma-
gistrado.
Hab.: Costas de México. Kiener et Fischer.
Icon. d. Coquil. viv. T. II, p. 146.

Conus pigmæus, Reeve.

Etim.: Cono pigmeo.
Hab.: Golfo de México. Kiener et Fischer,
l. c., p. 174.

Conus largillierti, Kiener.

Etim.: Cono de Largilliert.
Hab.: Costas de México. Kiener et Fischer,
l. c., p. 212.

Conus roseus, Lam?

Etim.: Cono rosado.
Hab.: G. de Méx.? Kiener et Fischer, l. c.,
p. 22.

Conus testudinarius, Martini.

Etim.: Cono testudinario. Lat. *testudo*, tor-
tuga.
Hab.: G. de Méx.? Kiener et Fischer, l. c., p.
117.

Conus verrucosus, Hwass.

Hab.:

Conus bruneus, Gray.

Hab.: Mulegé.

Gén.: *Pleurotoma*, Lamark, 1799.

Pleurotoma funiculata, Valemienes.

Etim.: Gr. *πλευρά*, costado; *τομή*, sección.
Latin *funiculus*, acordelado; *funiculus*, cordel.
Hab.: San Blas (Océano Pacífico). Kiener et
Fischer. Icon. d. Coq. viv. T. V, p. 24.

Pleurotoma bottæ, Val.

Hab.: Mazatlán. Kiener et Fischer. Icon. d.
Coq. viv. T. V, p. 33.

Pleurotoma callicesta, n. sp. Dall.

Hab.: Acapulco. Dredg. by the Albatros 650
fath.

Pleurotoma maura, Valenc.

Etim.: Pleurotoma mora.
Hab.: Mazatlán. Kiener et Fischer. Icon. d.
Coq. viv. T. V, p. 59.

Pleurotoma (antiplanes) perversa, Gabb.

Sin.: *Drillia perversa*, Gabb.
Hab.: Baja California.

CANCELLARIIDÆ.

Gén.: *Cancellaria*, Lam., 1799.

Cancellaria reticulata, Dilluqu.

Etim.: Latín *cancellatus*, de *cancello*, poner en
forma de celosía; *reticulata*, reticulada.
Hab.: Golfo de México.

Subgén.: *Admete*, Kröyer, 1842.

Admete microscopica, Dall.

Etim.:
Sin.: *Cancellaria microscopica*, Dall.
Hab.: Campeche, Yucatán.
«East American marine species, Dall.»

OLIVIDÆ.

Gén.: *Oliva*, Brugière, 1789.

Oliva angulata, Lamark.

Etim.: *Oliva angulosa*.
Hab.: Golfo de California à Panamá.

Oliva venulata, Lam.

Etim.: *Oliva venulada*.
Hab.: G. de California.

Oliva reticularis, Lam.

Etim.: G. de Cal.?
Hab.: G. de Cal.

Oliva literata, Lam.

Etim.: *Oliva escrita* (con letras).
Hab.: Veracruz.

Oliva porphyria, Linn.

Etim.: *Oliva purpurina*.
Hab.: G. de Cal.

Oliva (agaronia) testacea.

Hab.: G. de California.

Oliva araneosa, Lam.

Variedad: *Julietæ*, Duclós.
Hab.: Mazatlán.

Oliva araneosa, var. *polpasta*, Duclós.

Hab.: Mazatlán.

Oliva araneosa, var. *fuscata*, Marrat.

Hab.: G. de Cal.

Oliva araneosa, Lam.

Hab.: Triángulos, Isla de.

Gén.: *Olivella*, Swainson, 1835.

Olivella dama, Mause.

Hab.: Mazatlán.

Olivella amazona, Duclós.

Hab.: G. de México.

Olivella aureocincta, Carpenter.
Hab.: Mazatlán.
Etim.: Olivita con faja dorada. *Aureum*, oro;
cinctus, ceñido.
Hab.: G. de Gal.

Olivella semistriata, Gray.
Hab.: G. de Cal.

Olivella undatella, Lamark.
Hab.: G. de Cal. y Barra de Ocós.

Olivella tergina, Duclós.
Hab.: G. de Cal.

Olivella florialis, Duclos.
Hab.: Costas de México.

Olivella nivea, Gmelin.
Hab.: Mazatlán?

Gén.: Voluta.
Subgén.: *Aurinia*.

Aurinia dubia, Brod.
Hab.: G. de México.

MITRIDÆ.

Gén.: *Mitra*, Lamark, 1799.

Mitra sulcata, Gmelin.
Etim.: Mitra con surcos.

Hab.: Veracruz.

Mitra granulosa, Lamark.
Hab.: Piaya de Veracruz.

Mitra barbadensis, Gmelin.
Hab.: Méx.

HARPIDÆ.

Gén.: *Harpa*, Rumphius, 1705.

Harpa articulatis.

Hab.: G. de Cal.

Harpa nobilis.

FASCIOLARIIDÆ.

Género, *Fusus*, Klein, 1753.

Fusus du Petit Thonarsi.

Hab.: G. de Cal.

Gén.: *Fasciolaria*, Lamark, 1801.

Fasciolaria princeps, Sowerby.

Etim.: Lat. *fasciola*, bandeleta.

Hab.: G. de Cal. á Panamá.

Fasciolaria tulipa, Lam.

Hab.: Veracruz, Campeche, Progreso.

Fasciolaria distans, Lam.

Hab.: Bahía de Campeche. Kiener et Fischer.

Species d. Coq. vivants. T. VI, p. 4.

TURBINELLIDÆ.

Gén.: *Turbanella*, Lamark, 1799.

Turbanella knorri, Reeve.

Hab.: Playa de Veracruz.

Turbanella scolymus, Blainville.

Etim.: Trompito como cardo silvestre. *Turbo*, trompo; *scolymus*, especie de cardo silvestre.

Hab.: Campeche.

Género, Fulgur, Montfort, 1810.

Subgénero, *Sycotypus*, Browne, 1756.

Sycotypus (Fulgur) perversus, Linn.

Etim.: Sicotipo torcido. Gr. *συκί*, higo; *τύπος*, tipo. Latin *versus*, torcido, que voltea al revés.

Hab.: Veracruz.

Sycotypus (Fulgur) pyrum, Dylwyn.

Hab.: Veracruz.

VOLUTIDÆ.

Gén.: *Lyria*, Gray, 1847.

Lyria (Enæta) harpa, Barnes.

Sycotypus (Fulgur) pyrum. Variedad.

Hab.: Veracruz.

Género, *Melongena*, Schumacher, 1817.**Melongena patula.**Etim.: $\mu\eta\lambda\sigma\nu$, manzana; $\gamma\acute{e}r\sigma\sigma$, género.

Hab.: G. de Cal.

BUCCINIDÆ.

Gén.: Tritonidea, Swainson, 1840.

Sección: *Cantharus*.**Cantharus insignis**, Reeve.

Hab.: G. de Cal. á Panamá.

Gén.: *Pisania*, Bivona, 1832.

Género dedicado á Pisani.

Pisania tritonis, Reeve.

Hab.: Veracruz y Campeche.

Gén.: *Phos*, Montfort.**Phos intricatus**, Dall.

Hab.: Progreso y Yucatán.

NASSIDÆ.Gén.: *Nassa*, Lamark, 1799.**Nassa ambigua**, Pult.Etim.: Lat. *nassa*, *naxa*, una red en forma de manga ó cesto con cuello estrecho usada en la pesca.

Hab.: Progreso y Yucatán.

Nassa vibex, Say.Etim.: Nasa con moretones. Lat. *vibex*, el cardenal.

Hab.: Progreso y Veracruz.

COLUMBELLIDÆ.Gén.: *Columbella*, Lam., 1799.**Columbella ovulata**, Sowerby.Etim.: Lat. *columba*, paloma, haciendo referencia al color de paloma que tienen las conchas. *Ovulata*, oval.

Hab.:

Columbella mercatoria, Lam.

Columbela común.

Hab.: Progreso, Yucatán, Veracruz.

Columbella strombiformis, Lam.

Hab.: Tampico.

Columbella hemastoma, Sowerby.Etim.: Columbela boca de sangre; *aīμα*, sangre; *στόμα*, boca.

Hab.: G. de Cal. K. et Fischer. Sp. d. Coq. viv. T. IX, p. 4.

Columbella paytalida, Duclos.Sin.: *Columbella nutica*, Sow.

Hab.: Costas de Cal. K. et Fischer. Sp. d. Coq. viv. T. IX, p. 5.

Columbella nutica, Lamark. (Véase *C. paytalida*).**Columbella meleagris**, Duclos.Etim.: Latín *meleagris*, *idis*, la gallina africana, morisca ó india, por el color y las pintas que tiene la concha semejantes á las del ave.

Hab.: San Blas. Kiener et Fischer. Sp. d. Coq. viv. T. IX, p. 10.

Columbella nitida, Lamark.Hab.: G. de Méx. K. et Fischer, l. c., p. 39. Subgénero: *Anachis*.**C. Anachis avara**, Say.

Hab.:

C. Anachis pigmæa, Sowerby.

Hab.: G. de Cal.

Subgénero: *Strombina*.**C. Strombina bicanalifera**, Sowerby.

Hab.: G. de Cal. á Panamá.

C. Strombina maculosa, Sowerby.

Hab.: Cabo San Lucas, B. C.

MURICIDÆ.Gén.: *Murex*, Linneo.**Murex bicolor**, Valencienes.Etim.: Peñasco de dos colores. *Murex* era el nombre latino de un molusco del cual extraían la púrpura.

Hab.: Playa de Mulegé, Golfo de Cortés.

Murex spinicostatus, Valen.

Etim.: Peñasco de costillas espinosas.

Hab.: Veracruz, G. de México.

Murex regius, Swainson.

Etim.: Peñasco real.

Hab.: G. de Cal. á Perú.

Murex radix nigritus, Phil.

Etim.: Peñasco erizo ennegrecido.

Hab.: Playa de Mulegé, G. de Cortés.

Murex rufus, Lamark.

Etim.: Peñasco rubio.

Hab.: Playa de Veracruz.

Murex radix, Gmelin.

Peñasco erizo.

Hab.: Acapulco. Kiener et Fischer. Sp. d.

Coq. viv. T. VII, p. 60.

Murex brassica, Lamark.Peñasco repollo. Lat. *brassica*, repollo.

Hab.: Mazatlán. Kiener et Fischer, l. c., p. 68.

Subgénero: *Phyllonotos*.

- ♂*Phyllonotus pomum*, Gmel.
Hab.: De Beaufort á Venezuela, G. de México?
Subgén.: *Chicoreus*.
♂*Chicoreus rufus*, Lam.
De Cape Fear á Carthagena, G. de Méx.?
♂*Chicoreus brevifrons*, Lam.
De Sur Carolina á Carthagena, G. de Méx.?
Género: *Trophon*, Montfort, 1810.
- Trophon pinnatus**, n. sp.
Hab.: Baja California, Bahía Magdalena.
Dredged by the Albatros at 21-74 fatti.
Subgén.: *Boreotrophon*.
- Boreotrophon mazatlanicus**, n. sp. Dall.
Hab.: Mazatlán. Dredged by the Albatros at 995 fatti.
Género: *Muricidea*.
- Muricidea philippiana**, Dall.
Hab.: Cabo Catoche á Yucatán.
- Muricidea (pseudoneptunea) multangularis**, Philippi.
Sin.: *Fusus multangulus*, Philippi.
Muricidea hemphilli, Dall.
Fusus (pseudoneptuneus) multangulus, Kobelt.
Hab.: Yucatán.
- Muricidea ostrearum**, Conrad.
Sin.: *Murex ostrearum*, Conrad.
Urosalpinx floridanus.
Muricidea floridana, Dall.
Hab.: Yucatán.
Gén.: *Ocinebra*, Leach.
- Ocinebra cellulosa**, var. *levicula*, Dall.
Hab.: De Lookout á Yucatán.
Género: *Purpura*, Brugière, 1879.
(Subfamilia Purpurinæ).
- Purpura undata**, Lamark.
Hab.: Barra de Sta. Ana, Ver.
- Purpura trapa**, Botten.
Hab.: Veracruz.
- Purpura triserialis**, Blainville.
Hab.: G. de Cal. á Panamá.
- Purpura emarginata**, Deshayes.
Hab.: Martínez, California.
- Purpura patula**, Linneo.
Hab.: G. de Cal. á Panamá.
Gén.: *Sistrum*.
- Sistrum nodulosum**, C. B. Adams.
Hab.: Veracruz?
Subgénero: *Cuma*, Humphrey, 1797.
- Cuma kiosquiformis**. Duclos.
Hab.: G. de Cal. á Panamá.

CORALLIOPHILIDÆ.Gén.: *Coralliophilea*.*Coralliophilea galea*, Chemnitz.

Etim.: Gr. *κοράλλιον*, coral; *φίλος*, amigo.
Latín *galea*, morrión ó cresta del gallo.
Hab.:

TRITONIDÆ.Género *Triton*, Montfort, 1810.**Triton (simpulum) wiegmani**.

Hab.: Mazatlán.

Triton variegatus, Lamark.

Etim.: Triton adornado. Gr. *Τρίτων*, hijo de Neptuno; lat. *variegatus*, adornado.

Hab.: Sacrificios, Ver.

Triton antillarum, d'Orbigny.

Hab.: Veracruz.

Triton lignarius, Hinds.

Hab.: G. de California.

Triton lamellosus, Dunker.

Hab.: Veracruz.

Triton pilearis, Lin.

Hab.: Veracruz y Campeche.

Género: *Persona*, Montfort, 1810.**Persona cancellina**, Roissy.Etim.: Latin *persona*, máscara.

Hab.: Veracruz y Campeche.

CASSIDIDÆ.Género: *Cassis*, Klein, 1753.**Cassis tenuis**, Gray.

Etim.: Casco delgado. Latín *cassis*, casco; *tenuis*, delgado.

Hab.: G. de California, Veracruz.

Cassis abbreviata, Lamark.

Etim.: Casco reducido.

Hab.: G. de Cal. á Panamá.

Cassis ventricosa, Mart.

Etim.: Casco panzudo. Lat. *ventricosus*, ventrudo, panzudo.

Hab.: Veracruz.

Cassis testiculus, Lamark.

Hab.: G. de Cal.

Género: *Oniscia*, Sowerby, 1824.**Oniscia oniscus**, Lamark.

Etim.: Plinio daba este nombre á un gusanillo de la tierra con muchos pies, llamado también cienpiés. Gr. *ονίκος*, cucaracha.

Hab.:

DOLIIDÆ.Género: *Dolium*, Lamark, 1801.*Dolium galea*, Linneo.

- Etim.: Latín *dolum*, tonel; *galea*, morrión.
Hab.: Veracruz.
- Dolium perdix.**
Hab.: Veracruz.
Subgénero: *Malea*, Valenciennes, 1833.
- Malea ruigens**, Sowerby.
Sin.: *Dolium raigens*, Swainson.
Hab.: Mulegé (G. de Cortés).
Género, *Pyrula*, Lamark, 1799.
- Pyrula ficus**, Linneo.
Etim.: Perita higo. Diminutivo de *pyrum*, pe-
ra; *ficus*, higo.
Hab.: Veracruz.

CYPRÆIDÆ.Género *Ovula*, Brugière, 1879.**Ovula.**

Hab.: Veracruz.

Género, *Cypræa*, Linneo, 1758.**Cypræa cinerea**, Gmelin.Etim.: Gr. κύπρις, Cyprus, uno de los nom-
bres de Venus. Comúnmente se llama *porcelana*,
sinónimo de Ciprea. «Porcelana cenicienta.»

Hab.: Veracruz, G. de México.

Cypræa exanthema, Kiener.

Etim.: Porcelana exantema.

Hab.: Veracruz.

Cypræa sowerby, Kiener.

Etim.: Porcelana de Sowerby.

Hab.: Costas de California, Kiener et Fischer.
Icon. des Coq. viv. Gen. Porcelaine. T. I, p. 38.**Cypræa albuginosa**, Gray.

Hab.: G. de Cal. Kiener et Fischer, l. c., p. 38.

Cypræa lamarki, Duclos.

Hab.: Acapulco. Kiener et Fischer, l. c., p. 60.

Cypræa cervina, Lamark.Etim.: Porcelana cerval. Lat. *cervinus*, cerval.
Hab.: Antillas y costas del Golfo. Kiener et
Fischer, l. c., p. 72.**Cypræa cervinetta**, Kiener.Hab.: Antillas y costas del Golfo. Kiener et
Fischer, l. c., p. 74.**Cypræa arabicula**, Lamark.Hab.: Acapulco. Kiener et Fischer, l. c., p.
115.**Cypræa moneta**, Linneo.

Historia: Esta Ciprea se usó como moneda.

Hab.: Tampico?

Cypræa candidula, Gask.Hab.: «Costas de México.» Kiener et Fischer,
l. c., p. 150.Subgénero: *Trivia*, Gray, 1832.**Cypræa (trivia) quadripunctata**, Gray.

Etim.: Trivia, nombre mitológico.

Hab.:

Cypræa (trivia) pediculus, Lamark.

Hab.: Veracruz.

Cypræa (trivia) radians, Lamark.

Hab.: G. de Cal.

Cypræa (trivia) californica, Gray.

Hab.: G. de Cal.

Cypræa (trivia) sanguinea, Gray.

Hab.: G. de Cal.

Cypræa (trivia) solandre, Gray.

Hab.: G. de California.

Subgénero: *Pustularia*, Swainson, 1840.**Pustularia pustulata**, Lamark.

Hab.: G. de California.

STROMBIDÆ.Género: *Strombus*, Linneo, 1758.**Strombus galeatus**, Wood.Etim.: Gr. στρόμβος, nombre de
una concha. (Aristóteles y Plinio).Sin.: *Strombus galea*.Etim.: *Galea*, la celada, morrión ó caso.

Hab.: G. de California, Mazatlán.

Strombus gigas, Linneo.Etim.: Estrombo gigante. En francés se llama
Ala de águila. «Strombe aile d'aigle.»

Hab.: Sacrificios.

Strombus granulatus, Ward.

Etim.: Estombo granoso.

Hab.: G. de California.

Strombus bituberculatus, Lamark.

Hab.: Veracruz.

Strombus peruvianus, Swainson.

Hab.: G. de California.

Strombus pugilis, Linneo.Etim.: Estrombo de aletas. Lat. *pugil*, aleta.

Hab.: Veracruz.

Strombus gracilior, Sowerby.

Hab.: Costas de California. Kiener et Fischer.

Sp. des Coq. viv. T. IV, p. 31.

Strombus alatus, Gmelin.

Hab.: Golfo de México. Ward's Col.

CERITIDÆ.Género: *Cerithium*, Adamson, 1757.**Cerithium algicola**, A. B. Adams.

Etim.: Gr. κηνούσιον, nombre de un molusco.

Ceritio del invierno. Lat. *algus*, el hielo, el frío.

Hab.: G. de California.

Cerithium stercus-muscarum, Gould.

Etim.: Ceritio con piedura de moscas.

Hab.: Mazatlán.

Cerithium thonariæ, Sowerby.

Hab.: Progreso, Yucatán, Veracruz.

Cerithium nigresens, Menke.

Hab.: Veracruz, Campeche, Isla de Triángulo.

Cerithium maeulosum, Kiener.

Hab.: Acapulco. Kiener et Fischer. Sp. des Coq. viv. T. V. p. 36.

Hab.: G. de California.

Cerithium ferrugineum, Say.

Hab.: G. de México. Kiener et Fischer, l. c., p. 56.

Subgénero: *Vertagus*.

Vertagus germatus, Klein?

Hab.: G. de Cal.

Gén.: *Potamides*.

Potamides varicosus

Etim.: Potamida varicosa. Gr. ποταμός, río. Sin.: Cerithium varicosum, Valenciennes.

C. (potamides) hegewischi, Philippi.

Potamis hegewischi, Carpenter.

Cerithidea varicosa, var. mazatlana, Carpenter.

Cerithidea mazatlana, Reeve.

Cerithium mazatlanicum, Kobelt.

Potamides sacrata, Gould. (a).

Hab.: Mazatlán. B. C. A., p. 570.

Potamides montagnei, Tryon.

Sin.: Cerithium montagnei, d'Orbigny.

Cerithidea montagnei, Carpenter.

Cerithium reevianum, C. B. Adams.

Cerithidea reeviana, Mörch.

Hab.: Baja California, La Paz, Isla del Cerro, Mazatlán. B. C. A., p. 571.

Potamides costatus, Martens.

Sin.: Strombiformis costatus, Dacosta.

Strombus costatus, Montagn.

Cerithium costatum, Forbes et Hanley.

Cerithidea costata, Dacosta.

Cerithium salmacidum, Morelet.

Cerithidea salmacea, Mörch.

Hab.: Yucatán, Sisal, Progreso. B. C. A., p. 572.

Potamides tenuis, Pfeiffer.

Sin.: Cerithidea tenuis, Reeve.

Potamides scalariformis, Tryon.

Hab.: Teapa (Tab.). B. C. A., p. 573.

Subgénero: *Pyrazus*.

Pyrazus incisus.

Hab.: G. de Cal.

Subgénero: *Cerithidea*, Swainson, 1840.

Cerithidea (Potamides) montagnei, var. *mazatlana*.

Hab.: Mazatlán.

MODULIDÆ.

Género: *Modulus*.

Modulus modulus, Linneo.

Hab.: G. de México (Ver.), Campeche.

PLANAXIDÆ.

Gén.: *Planaxis*, Lamark, 1822.

Planaxis lineata, Lam.

Etim.: Latín *planus*, plano; *axis*, eje; *lineatus*, rayado.

Hab.:

VERMETIDÆ.

Gén.: *Vermetus*, Adamson, 1757.

Vermetus lumbricalis, Linneo.

Etim.: Vermeto, de *vermes*, gusano.

Hab.: Playa de Veracruz.

TURRITELLIDÆ.

Gén.: *Turritella*, Lam., 1799.

Turritella goniostoma, Valenciennes.

Etim.: Turritela. Gr. γονία, ángulo; στόμα, boca.

Hab.: G. de Cal. á Panamá.

Turritella tigrina, Kiener.

Hab.: G. de Cal. á Panamá.

MELANIIDÆ.

(Ampularias heliciformis. B. C. A.).

Gén.: *Melania*, Lamark, 1799.

Subgénero: *Pachychilus*, Lea, 1850.

Pachychilus glaphyrus, Morelet, 1849.

Etim.: Gr. παχύς, grueso; χεῖλος, labio; γλαφυρός, elegante, adornado.

Sin.: *Melania immanis*, Morelet.

Variedad: *polygonatus*.

* *pyramidalis* (a).

* *potamarchus* (b).

Hab.: Limón (Tab.), (a) Tabasco, (b) Tabasco.

B. C. A., p. 445.

Pachychilus pluristriatus, F. et C.

Etim.: Paquiquilo de muchas rayas.

Sin.: *Melania pluristriata*, Say.» *rubida*, Lea.» *labiosa*, Wiegman.**Pachychilus rubidus**, F. et C.

Hab.: Lago de Chapala (Jal.), México.

Pachychilus liebmansi, F. et C.Sin.: *Melania liebmansi*, Philippi.

Hab.: Playa Vicente (Ver.), México.

Variedad: *gracilior*.

Melania gassiesi, Reeve.

» *sallei*, in litt. Brot.**Pachychilus gassiesi**, C. et F.

Hab.: Río Teotalciago (Oax.). B. C. A., p. 453.

Pachychilus turati, F. et C.Sin.: *Melania turati*, Villa.» *berendti*, Dunker.» *gassiesi*, Reeve.

Hab.: Río Atoyac (Ver.), Río Jamapa (Ver.):

Xalapa, Córdoba. B. C. A., p. 454.

Pachychilus apis, F. et C.Sin.: *Melania apis*, Lea.

Hab.: Voracruz. B. C. A., p. 455.

Pachychilus indorum, H. et A. Adams.Sin.: *Melania loevissima*, Sowerby.» *indorum*, Morelet.» *sallei*, Reeve.» *radix*, Brot.

Hab.: San Andrés Tuxtla, Istmo de Tehuantepec, Palenque.

Variedad: *costato-plicatus*.» *varicosus*.

Hab.: Palenque. B. C. A., p. 455.

Pachychilus dallei, Pilsbry.Sin.: *Pachychilus walli*, Pilsbry.

Hab.: Tehuantepec. B. C. A., p. 456.

Pachychilus chrysalis, F. et C.Etim.: Paquiquilo larva. Gr. *χρυσάλις*, larva, crisálida.Sin.: *Melania chrysalis*, Brot.

Pachychilus larvatus, »

Hab.: San Pedro Gineta, Istmo de Tehuantepec, Chiapas, Ixtacomitán, Teapa (Tab.). B. C. A., p. 457.

Pachychilus panucula, F. et C.Sin.: *Melania panucula*.Variedad: *mexicanus*.

Melania mexicana, Reeve.

Hab.: Chiapas, (a) México. B. C. A., p. 458.

Pachychilus corvinus, H. et A. Adams.Sin.: *Melania corvina*, Morelet.

Hab.: Montañas de Poana (Tab.).

Pachychilus schiedeanus, Troshel.Sin.: *Melania schiedeana*.Vibex (Suga) *schiedeana*, Adams.*Melania variegata*, Wiegman.Variedad: *strebelianus* (a).

Hab.: Río de Masantla, Arroyo Viejo (Masantla), Córdoba, Coatepec (a) Arroyo Palpoala (Masantla). B. C. A., p. 462.

Pachychilus saussurei, F. et C.Sin.: *Meiaua saussurei*.

Hab.: B. C. A., p. 462.

Pachychilus pilosby, Martens.Sin.: *Potamanax rovirosai*, Pilsbry.

Hab.: Montes de Poana, Sta. Gertrudis (Tab.).

B. C. A., p. 463.

Pachychilus (glaphyrus) bicarinatus, var. *j.*

Hab.: Tabasco.

Pachychilus graphium, F. et C.

Hab.: Yucatán.

Pachychilus largillierti.

Hab.:

PLEUROCERIDÆ.Género: *Goniobasis*, Lea, 1862.**Goniobasis lacustris**, Morelet.

Hab.:

Goniobasis schiedeana, Pfeiffer.

Hab.: Misantla.

Véase *Pachychilus schiedeanus*.Género: *Ancylotus*, Say.Sinonimia: *Anculosa*, Say, 1821.**Anculosa carinata**, Brugière.

Hab.:

Anculosa subglobosa, Say.

Hab.:

LITTORINIDÆ.Género: *Littorina*, Férrussac, 1821.**Littorina planaxis**, Pfr.

Hab.: Baja California.

Littorina fasciata, Gray.

Hab.: G. de Cal. á Panamá.

Littorina zigzag, Phil.

Hab.: G. de Méx., Veracruz.

Littorina rudis, Gould.

Hab.: Campeche.

SOLARIIDÆ.Género: *Solarium*, Lamark, 1799.**Solarium æthiops**, Menke.Etim.: Lat. *solarium*, cuadrante solar; *æthiops*, etiope, negro; «cuadrante negro.»

Hab.: Veracruz.

Solarium granulatum, Lamark.

Etim.: Cuadrante granoso.

Hab.: Golfo de Cortés.

Sinonimia: *Campeloma*.

Campeloma decisa, Say.

Sin.: *Helix dissimilis*.

Hab.: México. M. C. G. E., núm. 198.

HIDROBIIDÆ.

Etim.: Gr. *ὕδωρ*, agua; *βιός*, yo vivo.
Género: *Amnicola*, Gould, 1841.

Amnicola orizabensis, F. et C.

Etim.: Habitante de los ríos. *Amnicola* (latín), el que habita cerca de un río.

Hab.: Orizaba. B. C. A., p. 432.

Amnicola coronata, Pfr.

Sin.: *Hydrobia* (*Pyrgula*) *coronata*, Pfr.

Paludestrina coronata, Chemnitz.

Pyrgulopsis coronata, Ancey.

Potamopirgus coronatus, Pilsbry.

Melania spinifera, Adams

Paludestrina caudeana, d'Orbigny.

Paludina ornata, Morelet.

Amnicola ornata, Fischer.

Trigonia ornata, Tate.

Amnicola chrysostoma, var. *B* y *γ*, Schutt.

Hydrobia chrysostoma, Pfr.

Pyrgulopsis spinosus, Call. et Pilsbry.

Hab.: Lago de los Cocos, Ver.; Mérida, Schkolkak.

Variedad: *unicarinata*.

Pyrgulopsis patzcuarensis, Pilsbry.

Hab.: Lago de Pátzcuaro, Veracruz.

Variedad: *chrysostoma*.

Hab.: Veracruz, Campeche, Sisal. B. C. A., p. 432.

Amnicola palomænsis, Mart.

Sin.: *Bythinella palomænsis*, Pilsbry.

Hab.: Laguna de Palomas (Chih.). B. C. A., p. 434.

Amnicola? seemani, Mart.

Sin.: *Hidrobia seemani*, F. et C.

Hab.: Durango. B. C. A., p. 435.

Amnicola? bakeri, Mart.

Sin.: *Potamopirgus bakeri*, Pilsbry.

Hab.: Yautepec, Morelos. B. C. A., p. 435.

PALUDINIDÆ.

Género: *Paludina*, Lamark, 1812.

Vivipara. B. C. A.

Vivipara inornata, Binney.

Sin.: *Paludina inornata*, F. et C.

Hab.: Chapotillo, Son. B. C. A., p. 426.

Subgénero: *Melanthro*.

VALVATIDÆ.

Género: *Valvata*, O. F. Müller, 1774.

Valvata humeralis, Say.

Hab.: Lagos de los alrededores de México.

Variedad: *pilsbryi*, Mart.

Hab.: Lago de Pátzcuaro.

Variedad: *strebeli*.

Hab.: Ciudad de México, en compañía de *Planorbis tenuis*, *Limnaea attenuata* y *Physa osculans*.

Variedad: *patzcuarensis*.

Hab.: Pátzcuaro. B. C. A., p. 637.

AMPULLARIIDÆ.

Género: *Ampullaria*.

Ampullaria flagellata, Say.

Sin.: *Ampullaria ochracea*, Jay.

Ampullaria malleata, v. Martens.

» *reflexa*.

» *flatilis*, Reeve.

» *violacea*, Val.

Hab.: Río Tenoya (Ver.), Córdoba, Tabasco,

Balancán, Teapa (Tab.).

Variedad: *sculpta*.

Hab.: Veracruz, Córdoba.

Variedad: *oaxacensis*.

Hab.: Monte de Mixtam, cerca de Corapam, Oax.

Variedad: *arata*.

Hab.: Vergara (Ver.), Córdoba, Lago de los Cocos, Balancan (Tab.), Río Usumacinta, Yucatán, Palizada, San Gerónimo.

Variedad: *melanostoma*.

Hab.: Papantla, Veracruz.

Variedad: *malleata*, Jonas.

Hab.: Tabasco. B. C. A., pp. 405 à 411.

Ampullaria violacea, Valenciennes.

Hab.: Acapulco. B. C. A., p. 414.

Ampullaria strebeli.

Sin.: *Ampullaria malleata*, var. *strebeli*, F. et C.

Variedad: *prasina* (a).

Hab.: Misantla, Huatusco, (a) Misantla. B. C. A., pp. 415 y 416.

Ampullaria innexa, C. et F.

Hab.: Monte de Mixtam, cerca de Coapam, Oax.; Playa del Pacífico, Oax. B. C. A., p. 416.

Ampullaria eumicra, F. et C.

Hab.: Estado de Oaxaca. B. C. A., p. 416.

Ampullaria monachus, F. et C.

Hab.: Sta. Efigenia, Tehuantepec. B. C. A., p. 416.

Ampullaria ghiesbreghti, Reeve.

Hab.: Chiapas, San Juan Bautista (Tab.), Tenosique y baches del Río Usumacinta.

Variedad: *miltochilas*, Reeve.

Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 418.

Ampullaria yucatanensis, F. et C.

Hab.: Yucatán, San Gerónimo, Dos Cenotas, Sehkolak, Mérida. B. C. A., p. 420.

Ampullaria cerassum, Hauley.

Hab.: Teapa (Tab.). B. C. A., p. 421.

Ampullaria erogata, F. et C.

Hab.: Cacoprieto, Tehuantepec. B. C. A., p. 422.

Ampullaria caliginosa.

Hab.:

CYCLOPHORIDÆ.Etim.: Gr. *kukloφóros*, que lleva un círculo; *kuklos*, círculo; *φορός*, el que lleva.Género: *Cyclophorus*, Montfort, 1810.Subgén.: *Amphiclotus*.Etim.: Gr. *αμφί*, de uno y otro lado; *kukloπós*, circular, redondeado.**Cyclophorus (amphiclotus) maleri**, Mart.Sin.: *Amphiclotus maleri*, F. et C.

Hab.: Sta. Efigenia, Tehuantepec, Tabasco. B. C. A., p. 6.

Cyclophorus (amphiclotus) texturatus, Mart.

Etim.: Cicloforo entretejido.

Sin.: *Cyclotoma texturatus*, Sowerby.

Hab.: Tehuantepec, Cerro de Plumas, cerca de Puerto Angel. B. C. A., p. 6.

Cyclophorus (amphiclotus) boucardi, Mart.Sin.: *Cyclotoma (cyclophorus) boucardi*, Pfr.*Amphiclotus boucardi*, F. et C.

Hab.: Córdoba (Ver.). B. C. A., p. 6.

Cyclophorus (amphiclotus) lutescens, Mart.

Etim.: Cicloforo blando como arcilla.

Sin.: *Cyclotoma (cyclophorus) lutescens*, Pfr.*Cyclotoma lutescens*, Pfr.*Habropoma lutescens*, F. et C.*Cyclotus cooperi*, Tryon.

Hab.: Mazatlán (Sin.), Panistlahuaca, cerca de Rio Verde (Oax.). B. C. A., pp. 6 y 7.

Género: *Aperostoma*, Tröschel, 1847.Etim.: *ἄπηρος*, no mutilado; *στόμα*, boca.Subgénero: *Cystotoma*, Mörch, 1852.

(Habropoma, Crosse et Fischer, 1880).

Etim.: Gr. *κυρτός*, encorvado; *τομή*, corte.**Cyclophorus (cystotoma) mexicanus**, Mart.Sin.: *Cyclotoma mexicanum*.*Cyclotus mexicanus*.*Cyclophorus mexicanus*.*Habropoma mexicanum*.

Hab.: Papantla, en los bosques, al N. de Veracruz; Cuesta de Misantla (Ver.), Misantla, Xalapa. B. C. A., p. 7.

Cyclophorus (cystotoma) sallleanus, Mart.Sin.: *Cystotoma mexicanum*, Menke.*Cyclophorus mexicanus*, B. Pfr.*Habropoma sallleanus*, F. et C.

Hab.: Córdoba (Ver.), Barranca de Sta. María, cerca de Mirador, Orizaba, Misantla, Quilate, Atoyac, Coatepec, Xalapa. B. C. A., pp. 7 y 8.

Género: *Megalostoma*, Swainson, 1840.Etim.: Gr. *μέγα*, grande; *λωμα*, borde; *στύμα*, boca; boca de borde grande. *Megalostoma*, boca grande ó ancha.Tomocylus, *τομός*, cortado; *κύκλος*, círculo; «círculo recortado.»Subgénero: *Tomocylus*, C. et F., 1872.**Megalostoma (tomocylus) gealei**, Mart.Sin.: *Tomoeyclus gealei*, C. et F.

Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 10.

Megalostoma (tomocylus) guatemalense, Mart.Sin.: *Cyclotoma guatemalense*, Pfr.*Tomocylus guatemalense*, C. et F.

Hab.: San Martín Tuxtla, al Sur del E. de Veracruz. B. C. A., p. 11.

Género: *Pterocyclus*, Benson, 1832.Etim.: Gr. *πτερόν*, ala; *κύκλος*, círculo; *Pterostoma* circular en forma de ala uno de sus bordes.Subgénero: *Cyclotus*, Guilding, 1840.(Fam. Cyclophoridae; Gén. *Cyclotus*; Subgén. *Aperostoma*). B. C. A.**Cyclotus (aperostoma) dysoni**, Pfr.Sin.: *Cyclotus dysoni*.*Cyclophorus dysoni*.*Platystoma (aperostoma) dysoni*.*Neocyclotus dysoni*.*Cyclophorus translucidus*.*Cyclotus translucidus*.Variedad: *ambiguus* (a).» *berendti* (b).

Hab.: Río Grande (Oaxaca); Ixtapa y Panistlahuaca (Oax.); Chiapas, Tabasco, Teapa, Mon-

tañas de Poana, Yucatán, Campeche, Tabí, al NE. de Yucatán, Silam, Tekanto, Labna, Tunkas, Tieul, Tilpech, Mirador, (a) Soledad, entre Córdoba y Orizaba; (b) Yucatán, Campeche, Veracruz, Mirador. B. C. A., pp. 3 y 4.

CYCLOSTOMATIDÆ.

Gén.: *Choanopoma*, L. Pfeiffer, 1847.

Choanopoma chiapasense, F. et C.

Etim.: Gr. *χόαρος*, embudo; *πώμα*, opérculo. Opérculo en forma de embudo.

La variedad *majus* del *Choanopoma trochleare*.

Hab.: Chiapas. B. C. A., p. 13.

Choanopoma sumichrasti, C. et F.

Hab.: Istmo de Tehuantepec. B. C. A., p. 13.

Gén.: *Cistula*, Gray, 1850.

Subgénero: *Chondropoma*, L. Pfeiffer, 1847.

Chondropoma cordobanum, Pfr.

Sin.: *Cyclostoma (chondropoma) cordobanum*, Pfr.

Hab.: Córdoba (Ver.), Atoyac. B. C. A., p. 17.

Chondropoma largillierti, Reeve.

Etim.: Gr. *χόνδρος*, cartílago; *πώμα*, opérculo.

Sin.: *Cyclostoma largillierti*, Pfr.

Choanopoma largillierti, Gray.

Cistula largillierti, Pfr.

Hab.: Yucatán, Mérida, Campeche. B. C. A., p. 19.

Chondropoma vespertinum, F. et C.

Sin.: *Cyclostoma vespertinum*, Morelet.

Hab.: Ruinas de Palenque (Chiapas). B. C. A., p. 19.

Chondropoma truncatum, Pfr.

Sin.: *Cyclostoma triculatum*, Wiegman.

Hab.: México B. C. A., p. 20.

HIPPONYCIDÆ.

Género: *Hipponyx*, Defrance, 1819.

Hipponyx incurvus.

Etim.: Gr. *ἵππος*, caballo; *ὄνυξ*, uña; latín *incurvus*, encorvado.

Hab.:

CAPULIDÆ.

Etim.: En latín *capulus* significa el féretro, ataúd ó caja en que se encierran los cadáveres. En Cicerón tiene el significado de puño de la espada. El género *Capulus* tiene por sinónimo *Pileopsis*, aspecto de sombrero, de *πῖλος*, sombrero. Parece más natural referir á esta voz la etimología.

Género: *Crucibulum*, Schumacher, 1817.

Crucibulum imbricatum, Sow.

Hab.: G. de Cal. á Panamá.

Crucibulum auriculatum, Chemnitz.

Hab.: México.

Género: *Crepidula*, Lamark, 1799.

Crepidula dorsata.

Variedad: *lingulata*, Brodesip.

Etim.: Latín, zapatilla. *Crepida* es un zapato como el que usan en la República Mexicana los rancheros, llamado de orejas y que se amarran con una tira de gamusa.

Hab.: G. de California.

Crepidula aculeata, Gmelin.

Etim.: Zapatilla de punta. Latín *aculeata*, agujada.

Hab.: Mazatlán.

Crepidula fornicata.

Etim.: Zapatilla abovedada. Lat. *fornicata*, formada como bóveda.

Hab.: G. de Cal.

NATICIDÆ.

Género: *Natica*, Adamson, 1757.

Natica pritchardi, Forbes.

Hab.: La Paz, G. de Cal.

Natica catenata, Phillips.

Etim.: *Natica* esterada. En Marc. hay esta locución: *catenata lagena*, botella ó frasco esterado, cubierto de mimbres ó juncos. *Catenata* es decir que tiene el aspecto de estar cubierta, debido á sus dibujos.

Hab.: G. de Cal.

Natica cancrena, Linneo.

Hab.: Veracruz.

Natica ovum, Lamark.

Hab.: G. de México, Veracruz.

Natica glauca, Valenciennes.

Hab.: G. de Cal.

Natica (lunatia) bifasciata, Gray.

Hab.: La Paz, G. de Cal.

Natica (lunatia) otis, Bradesip.

Hab.: G. de Cal.

JANTHINIDÆ.

Género: *Janthina*, Lamark, 1799.

Janthina striulata, Carpenter.

Etim.: *ἰανθίνος*, violeta; lat. *striulatus*, estriado.

Hab.: Mazatlán.

SCALARIIDÆ.

Género: *Scalaria*, Lamark, 1801.
Sinonimia: *Scala*.

Scala scipio, Dall.

Hab.: Veracruz.

Scala centiquadra, Mörch.

Hab.: Hateras á Yucatán..

SUBORDEN II. SCUTIBRANCHIATA.**PROSERPINIDÆ.**

Género: *Proserpina*, Gray, 1839.
Subgénero: *Ceres*.

Proserpina (ceres) eolina, Mart.

Sin.: *Carocolla eolina*, Duclós.

Odontostoma (Carocolla) eolinus, Pfr.

Ceres eolina, Gray.

Hab.: México, E. de Veracruz, Huatusco, Barranca de Dos Puentes, Cerros de Plumas y de Palma, Sierra de Matlaquihuahuitl, cerca de Toxpan. B. C. A., pp. 44 y 609.

Proserpina (ceres) sallleana, Pfr.

Sin.: *Ceres sallleana*, Gray.

Hab.: Córdoba, Huatusco, Barranca de Dos Puentes, Cerro de Plumas. B. C. A., p. 45.

Proserpina (ceres) nelsoni, Mart.

Sin.: *Ceres nelsoni*, F. et C.

Hab.: Pilitla, cerca de San Luis Potosí. B. C. A., p. 609.

Subgénero: *Proserpinella*.

Proserpina (proserpinella) berendti, Mart.

Sin.: *Proserpinella berendti*, Bland.

Hab.: Mirador. B. C. A., p. 45.

HELICINIDÆ.

Gén.: *Helicina*, Lamark, 1799.

Helicina ghiesbreghti, Pfr.

Hab.: Irapuato, cerca de Guanajuato; Chiapas. B. C. A., p. 28.

Helicina amoena, Pfr.

Sin.: *Helicina purpurea flava*, Morelet.

Hab.: Yucatán, Campeche. B. C. A., p. 28.

Helicina cinctella, Schuttleworth.

Sin.: *Helicina botteriana*, Pfr.

Hab.: Córdoba, Veracruz, Cerro de Plumas, Mirador, Orizaba, Tepic (Jal.). B. C. A., p. 29.

Helicina zephyrina, Duclós.

Sin.: *Helicina turbinata*, Wiegmann.

Hab.: Tampico, Jalapa, Mirador, Córdoba,

Huatusco, Papantla, Misantla, Rio de Misantla (Ver.). B. C. A., p. 30.

Helicina sinuosa, Pfr.

Hab.: México B. C. A., p. 32.

Helicina deppeana, v. Mart.

Sin.: *Helicina turbinata*, var. Pfr.

Helicina cordilleræ, Sowerby.

Hab.: México Jalapa, Soledad, Yalalag, al Sur de Villa Alta (Oax.). B. C. A., p. 32.

Helicina cordilleræ, Sallé.

Hab.: Volcán de Orizaba á 12,000 pies. B. C. A., p. 33.

Helicina chrysocheila, Binney.

Variedad: *schuttleworthi*, Binney (a).

Hab.: México, Tamaulipas, Tampico, (a) Córdoba. B. C. A., p. 33.

Helicina tenuis, Pfr.

Sin.: *Helicina ambeliana*, Sowerby.

» *vernalis*, Morelet.

» *lindani*, Pfr.

» *chiapensis*, Pfr.

Hab.: Sayula (Jal.), Irapuato (Gto.); Soledad, entre Córdoba y Orizaba; Chiapas, Teapa y San Juan Bautista (Tabasco); Tapinapa, Yucatán. B. C. A., p. 34.

Helicina fragilis, Morelet.

Variedad: *elata*, Schuttleworth.

» *merdigera*, Sallé.

Hab.: Córdoba (Ver.), Veracruz, México, Omilteme. B. C. A., p. 35.

Helicina succineta, sp. n. Mart.

Hab.: Córdoba, Misantla, Tlacolula. B. C. A., p. 36.

Helicina raresulcata, Pfr.

Hab.: Veracruz. B. C. A., p. 36.

Helicina arenicola, Morelet.

Hab.: Sisal (Yuc.). B. C. A., p. 36.

Helicina punctisulcata, sp. n. Mart.

Hab.: Omilteme (Gro.) á 8,000 pies. B. C. A., p. 36.

Helicina durangoana, Maurson.

Hab.: Sierra Madre, Ventanas (Dgo.). B. C. A., p. 37.

Helicina delicatula, Schutt.

Sin.: *Helicina heloisæ*, Sallé.

» *flavida*, var. Streb.

Variedad: *albida* (a).

Hab.: Córdoba, Veracruz, México, S. Carlos (Oax.), (a) Atoyac. B. C. A., p. 37.

Helicina oweniana, Pfr.

Hab.: Chiapas, Teapa (Tab.). B. C. A., p. 38.

Helicina notata, Sallé.

Hab.: México, Córdoba, Atoyac. B. C. A., p. 38.

- Helicina flava**, Menke.
Sin.: *Helicina trossula*, Morelet.
Variedad: *strebeli*, Pfr.
» *brevilabris*, Pfr.
Hab.: Cuernavaca, Papantla, Veracruz, Misantla, Mirador, Córdoba, Atoyac, Tabasco, Teapa, San Juan Bautista, Chiapas. B. C. A., p. 38.
- Helicina borealis**, sp. n. Mart.
Hab.: Villa Lerdo (Dgo.). B. C. A., p. 40.
- Helicina lirata**, Pfr.
Sin.: *Helicina unidentata*, Pfr.
Variedad: *rusticella*.
Hab.: Veracruz, Chiapas, Teapa y San Juan Bautista (Tab.); Yucatán, Isla del Carmen, G. de Campeche. B. C. A., p. 41.
- Helicina mohriana**, Pfr. (Dudosa).
Hab.: Orizaba. B. C. A., p. 42.
- Helicina lævis**, Pfr.
Hab.: Baja California.
- Helicina orbicularis**, Say.
Hab.: Monterrey, N. L.
- Helicina zephyrina dientensis**, Dencos.
Hab.: Monterrey, N. L.
Subgénero: *Schazichila*, Schuttleworth.
- Schazichila nicoleti**, Pfr.
Sin.: *Helicina nicoleti*, Pfr.
Hab.: Córdoba, Cerro de Plumas, Jalapa. B. C. A., p. 43.
- Schazichila panucea**, Schutt.
Sin.: *Helicina panucea*, Morelet.
Helicina alata, Sowerby.
Variedad: *B. misantlensis*, F. et C. (a).
Hab.: Aguascalientes, Jalapa, (a) Misantla. B. C. A., p. 43.
- Schazichila alata**, Mart.
Sin.: *Helicina alata*, Menke.
» *panucea*, Reeve.
Hab.: México, Córdoba, Veracruz, Mirador y San Cristóbal, cerca de Orizaba; Atoyac, Jalapa, Misantla, Orizaba. B. C. A., p. 608.
- Schazichila fragilis**, Pilsbry.
Hab.: Diente, cerca de Monterrey, N. L. B. C. A., p. 608.
- Schazichila vanatlai**, Pilsbry.
Hab.: Diente (Monterrey), N. L. B. C. A., p. 608.
- Schazichila hidalgoana**, Dall.
Hab.: Encarnación (Hgo.). B. C. A., p. 608.
- NERITIDÆ.**
- Género: *Nerita*, Adamson, 1757.
- Nerita scabricosta**, Lamark.
Etim.: *υηρίτης*, nombre de una concha (Aristóteles) de costillas rugosas; *scabrum*, rugoso; *costa*, costilla.
Hab.: G. de California á Panamá.
- Nerita versicolor**, Lamark.
Etim.: Nerita de varios colores. Lat. *versicolor*, de varios colores.
Hab.: Veracruz.
- Nerita tessellata**, Gmelin.
Etim.: Nerita adornada con cuadritos. Latín *tessellatus*, tejido ó adornado con cuadros.
Hab.: G. de California.
- Nerita bernhardi**, Reclus.
Etim.: Nerito de Bernhardt.
Hab.: G. de California.
Género: *Neritina*, Lamark, 1809.
Sinonimia: *Neritella*, Humphry, 1797.
- Neritina punctulata**, Mart.
Etim.: Neritina, diminutivo de Nerita, pringada.
Sin.: *Neritina fuscellabris*, Wiegman.
» *aperta*, Budgin.
» *pulligera*, Deshayes.
Hab.: Ríos de Misantla y Colipa. B. C. A., p. 470.
- Neritina lineolata**, Mart.
Etim.: N. rayada ó listada.
Sin.: *Neritina clandestina*, Menke.
» *olivacea*, Wiegmann.
» *gravis*, Morelet.
» *floridana*, Schuttleworth.
- Neritella reclinata*, Say.
Variedad: *reclinata* (a).
Teodoxus reclinatus.
Neritina microstoma.
Variedad: *reticulata* (b).
Hab.: Tabasco, Yucatán, Isla del Carmen, Tampico, Río de Tecolutla, Río de Misantla, Veracruz, Tenoya, Cerro de Palma (Córdoba), San Carlos (Oax.), (a) Tampico, Río de Tecolutla, Veracruz, San Carlos (Oax.), (b) Tampico, Veracruz. B. C. A., pp. 471-473.
- Neritella reclinata*, Say.
Hab.: Río Jamapa (Ver.).
- Neritina cassiculum**, Mart.
Etim.: N. redecilla. Lat. *cassiculum*, red pequeña.
Hab.: Mazatlán. B. C. A., p. 474.
- Neritina mexicana**, Mart.
Hab.: México B. C. A., p. 476.
- Neritella virginea**, Linneo.
Hab.: Actopam (Ver.).

TURBINIDÆ.

Género: *Turbo*, Linneo, 1758.

Turbo fluctuosus, Wood.

Etim.: Trompo ondulado.

Sin.: *Callopoma fluctuosum* (Carpenter. Mazatlán shells, p. 223).

Turbo fokkeri, Jonas.

» *assimilis*, Kiener.

Var. *B*: *Turbo tessellatus*, Kiener.

Turbo moltkianus, Reeve.

Hab.: México, California (Carpenter). L. C. Kiener. Sp. des Coq. viv. T. IX, p. 61.

Callopoma fluctuosum, Carp.

Hab.: G. de Cal. (Mazatlán?).

Turbo squamiger, Reeve.

Hab.: Costas occidentales de México. L. C. Kiener. Sp. des Coq. viv. T. IX, p. 95.

Género: *Astralium*, Link, 1807.

Subgénero: *Lithopoma*, Gray, 1850.

Lithopoma tuber, Chemnitz.

Etim.: *litopoma* albérchigo. Gr. λίθος, piedra; πῶμα, opérculo; latin *tuber*, albérchigo.

Sin.: *Trochus tuberculatus major*, Martini.

Turbo tuber, d'Orbigny.

Trochus tuber, Linneo.

Hab.: Veracruz.

Subgénero: *Uvanilla*, Gray, 1850.

Uvanilla olivacea, Mawe.

Hab.: G. de Cal. á Panamá.

Uvanilla nuguis, Mawe.

Hab.: G. de Cal. á Panamá.

Subgénero: *Pomaulax*, Gray, 1850.

Pomaulax undosus, Woodward.

Etim.: πᾶμα, opérculo; αἴλαξ, surco; lat. *undosus*, ondeado.

Sin.: *Calcar undosum*, Woodward.

Trochus gigas, Anton.

Trochus undosus, Woodward.

Hab.: Bahía Sta. María Magdalena (Cal.).

Género: *Phasianella*, Lamark, 1804.

Phasianella compta, Gould.

Hab.: Mazatlán.

TROCHIDÆ.

Género: *Trochus*, Linneo, 1758.

Trochus saxosum, Philippi.

Etim.: Gr. τροχός, rueda; lat. *saxosum*, petroso.

Sin.: *Calcar saxosum*, Philippi.

Hab.: Golfo de México (Ver.). L. C. Kiener. Sp. des Coq. viv. T. XII, p. 19.

Trochus olivaceus, Wood.

Sin.: *Calcar olivaceum*, Wood.

Trochus erythrophthalmus, Philippi.

Trochus brevispinosus, Valenciennes.

Hab.: Mazatlán. (G. de Cal.). L. C. Kiener.

Sp. des Coq. viv. T. II, p. 47.

Trochus gibberosus, Chemnitz.

Sin.: *Calcar gibberosum*, Chemnitz.

Trochus inaequalis, Martyn.

Trochus diadematus, Valenciennes.

Hab.: Acapulco. L. C. Kiener. Sp. des Coq. viv. T. II, p. 48.

Trochus bushi, Philippi.

Sin.: *Calcar bushi*, Phil.

Trochus inermis, Lamark.

Turbo bushi, C. B. Adams.

Hab.: G. de Cal. á Panamá. L. C. Kiener. Sp. des Coq. viv. T. XII, p. 50.

Trochus multiper, var. *B*, Jonas.

Sin.: *Trochus nuguis*, Wood.

Calcar nuguis, Wood.

Trochus amictus, Val.

Turbo digitatus, Desh.

Hab.: Acapulco (Deshayes). L. C. Kiener. Sp. des Coq. viv. T. XII, p. 53.

Trochus dolarius, Chemnitz.

Sin.: *Trochus canaliculatus*, Martyn.

Zizyphinus canaliculatus, Reeve.

Hab.: Costas de California. L. C. Kiener. Sp. des Coq. viv. T. XII, p. 71.

Trochus canaliculatus, Martin.

Hab.: Baja California.

Trochus annulatus, Martin.

Sin.: *Zizyphinus annulatus*, Reeve.

Trochus virgineus, Chemnitz.

Trochus moniliferus, Philippi.

Hab.: California. L. C. Kiener. Sp. des Coq. viv. T. XII, p. 74.

Hab.: Baja California.

Trochus carneolus, Lamark.

Sin.: *Trochus fasciatus*, Bom.

Trochus dentatus, Gmelin.

Hab.: Veracruz, Costas de México. L. C. Kiener. Sp. des Coq. viv. T. XII, p. 195.

Trochus reticulatus, Wood.

Hab.: Costas de México. L. C. Kiener. Sp. des Coq. viv. T. XII, p. 212.

Trochus rugosus, A. Adams.

Sin.: *Chlorostoma rugosum*, A. Adams.

Hab.: G. de California. L. C. Kiener. Sp. des Coq. viv. T. XII, p. 231.

Trochus scalaris, Anton.

Sin.: *Globulus indusi*, Chemnitz.

Trochus canaliculatus, d'Orbigny.

- Monodonta livido-maculata**, Adams.
Hab.: G. de México. Sp. des Coq. viv. T. XII, p. 253.
- Trochus gallina**, Forbes.
Sin.: *Trochus (monodonta) pyriformis*, Gould.
Hab.: Costas de California, Baja California.
Chlorostoma gallina, Forbes.
Hab.: Isla Catalina (Cal.).
Nota: Kiener dice: «Por los caracteres de su columela, esta especie constituye el punto de transición entre los *Chlorostoma* de la costa O. de América del Norte y los *Tegula*.»
- Trochus ligulatus**, Meuke.
Sin.: *Omphalius ligulatus*, Carp.
» *fusceccens*, » (Hab.: Isla Catalina).
Hab.: Mazatlán, G. de Cal. L. C. Kiener. Sp. des Coq. viv. T. XII, p. 383.
- Trochus aureotinctus**, Forbes.
Sin.: *Turbo cataniferus*.
Hab.: Acapulco. (Véase *Omphalius aureotinctum*). L. C. Kiener. Sp. des Coq. viv. T. XII, p. 94.
- Trochus tampaensis**.
Hab.: Veracruz, Progreso, Yucatán.
Género: *Neomphalius*, Fischer, 1885.
Sinonimia: *Omphalius*, Philippi.
- Omphalius indusi**, Philippi.
Hab.:
- Omphalius aureotinctum**, Forbes.
Hab.: G. de California.
- Omphalius fasciatus**, Born. (*Trochus carneolus?*).
Hab.: Veracruz.
- Fissurella alba**.
Hab.: Mazatlán.
- Fissurella glauca**, Kiener.
Hab.: Méx.
- Fissurella cancellata**, Sowerby.
Hab.: Méx.
- Fissurella geminulata**, Reeve.
Hab.: Méx.
- Fissurella fascicularis**.
Hab.: Méx.
Género: *Fissurellidea*, A. d'Orbigny, 1839.
- Fissurellidea pustulata**, Linneo.
Hab.: Veraeruz.
- Fissurellidea fascicularis**, Lamark.
Hab.: Veraeruz.
Subgén.: *Lucapina*, Gray, 1840.
- Lucapina crenulata**, Sow.
Hab.: Baja California.

ACMÆIDÆ.Género: *Acmaea*, Eschscholtz, 1828.

- Acmaea mesolena**, Menke.
Etim.: Gr. *ακμαιος*, vigoroso; *μεσος*, medio;
λευκός, blanco.
Hab.: Mazatlán.
- Acmaea spectrum**, var. *striata*, Nuttall.
Hab.: B. Cal.
Subgén.: *Lotia*, Gray, 1847.
- Lotia zizantea**, Gray.
Hab.: California.

PATELLIDÆ.Género: *Patella*, Lister, 1688.

- Patella discors**, Philippi.
Hab.: Mazatlán.
- Patella fascicularis**, Meuke.
Hab.: Mazatlán.
Subgénero: *Nacella*, Schumacher, 1817.
- Nacella incessa**, Hinds.
Hab.: Baja California.

HALIOTIDÆ.Género: *Haliotis*, Linneo, 1735.

- Haliotis splendens**, Reeve.
Etim.: Gr. *ἀλς*, mar; *οὐρά*, *ωτός*, oreja.
Hab.: Mazatlán, Baja California.

FISSURELLIDÆ.Género: *Fissurella*, Brugière, 1789.

- Fissurella alternata**, Say.
Etim.: Lat. *fissura*, hendidura.
Hab.: Veracruz.
- Fissurella barbadensis**, Gmelin.
Hab.: Veracruz.
- Fissurella virescens**, Sowerby.
Hab.: Mazatlán, Veracruz.
- Fissurella nodosa**, Bompland.
Hab.: Veracruz.

ORDEN: POLYPLACOPHORA.

CHITONIDÆ.Gén.: *Chiton*, Linneo, 1758.

- Chiton (callistochiton) decoratus**.
Etim.: Gr. *χιτών*, túnica, oscabrión.
Hab.: B. California.
- Chiton (pallochiton) lanuginosus**.
Hab.: B. California.

Chiton conspicua, Carpenter.

Hab.: B. California.

Chiton stelleri, Midd.

Hab.: B. California.

Chiton articulatus, Sowerby.

Hab.: Tepic.

SUBORDEN: PECTINACEA.

SPONDYLIDÆ.Gén.: *Spondylus*, Linneo, 1758.**Spondylus croceus**, Chemnitz.

Etim.: Espondilo azafranado.

Hab.: G. de Méx., Veracruz.

Spondylus princeps, Brodesip.

Hab.: Golfo de México y de California.

Spondylus gunoni, Costa.

Hab.: G. de Méx. á las Antillas. Marine mollusks, IV. H. Dall.

LIMIDÆ.Género: *Lima*, Brugière, 1742.**Lima scabra**, Born.

Hab.: G. de Cal.

PECTINIDÆ.Género: *Pecten*, Lamark, 1799.**Pecten subnodosus**, Sowerby.Etim.: Lat. *pecten*, peine; *subnodosus*, algo nudoso.

Hab.: Playa de Mulegé (G. de Cortés).

Pecten nodosus, Linneo.

Hab.: Veracruz.

Pecten turgidus, Lamark.

Hab.: Veracruz.

Pecten ventricosus, Sowerby.

Hab.: Ver.?

Pecten ornatus, Lamark.

Hab.: Veracruz.

Pecten fusco-purpureus, Conrad.

Hab.: Veracruz.

Pecten jacobaeus.

Hab.: Mulegé.

Pecten dislocatus.

Hab.: Ver., Barra de Sta. Ana.

Género: *Amusium*.**Amusium mortoni**, Say.

Hab.: G. de Méx. á Haití. Dall.

SUBORDEN III. MYTILACEA.

AVICULIDÆ.

Pseudolamellibranchiata. B. C. A.

Género: *Avicula*, Klein, 1758.**ANOMIIDÆ.**Género: *Anomia*, Linneo, 1767.**Anomia glabra**, Verrill.Etim.: Gr. ἀρροφός, irregular; lat. *glabrum*, liso.

Hab.: Veracruz.

Anomia lampe, Gray.

Hab.:

Avicula sterna, Gould.

Etim.: Lutin *avicula*, avecita; *sterna*, aplanada.
Hab.: Ver.?

Avicula atlantica, Lam.

Hab.: Hateras á Venezuela.

Avicula crocata, Sowerby.

Hab.: Veracruz.

Avicula margaritiphora.

Hab.:

Subgén.: Meleagrina, Lamark, 1812.

Sinonimia: *Margaritiphora*, Megeole, 1811.

Margaritiphora fimbriata, Dunker.

Sin.: Margaritana *margaritiphora*, Linn.

Margaritophora fimbriata, Dunker.

Hab.: G. de Cal., Tepic, Mazatlán.

Género: *Perna*, Brugière, 1792.

Perna obliqua, Lamark.

Hab.: Ver.?

Género: *Pinna*, Linneo, 1758.

Pinna rugosa, Sowerby.

Hab.: G. de México.

Pinna muricata, Linneo.

Hab.: G. de México, Laguna de Términos, Campeche.

Arca grandis, B. et L.

Hab.: Mazatlán.

Arca jamaicensis, Gmel.

Hab.: G. de Méx. Desde N. Carolina á Venezuela.

Subgénero: *Barbatia*, Gray, 1840.

Barbatia gradata, Brodesip.

Hab.: Veracruz.

Género: *Macrodon*.

Macrodon asperula, Dall.

Hab.: De Fernandina á Yucatán.

Género: *Limopsis*, Sani, 1827.

Limopsis cristata, Jeffreys.

Hab.: Norway á Yucatán.

NUCULIDÆ.

Género: *Nucula*, Lamark, 1799.

Nucula cimella, Dall.

Hab.: Florida Str. á Yucatán.

Nucula verrilli, Dall.

Hab.: Rhode Island á Yucatán.

LEDIDÆ, Dall.

Género: *Leda*, Schumacher, 1817.

Fam.: Nuculidæ.

Leda solidula, Smith.

Hab.: Hatteras al Brasil. (Costas de México?).

Subgénero: *Yoldia*, Möller, 1842.

Fam.: Nuculidæ.

Yoldia solenoides, Dall.

Hab.: Min. Delta á Yucatán.

Yoldia liorhina, Dall.

Hab.: G. de Méx. á Barbadas.

SUBORDEN V. SUBMYTILACEA.**UNIONIDÆ.***

* Synopsis of the Nayades, or pearly freshwater mussels by Charles Terrey Simpson.

Subfamilia: Unioninæ, Swainson, 1840.

(Heterogenæ).

Género: *Lampsilis*, Rafinesque, 1820.

Lampsilis anodontoides.

Variedad: *floridensis*, Lea.

Sin.: *Unio floridensis*, Lea.

Margarion (unio) floridensis, Lea.

Hab.: México Ch. F. Simpson. Syn. of the Naiades, p. 544. (Proc. of the N. M. Wash., núm. 1,205).

SUBORDEN IV. ARCAEA.**ARCIDÆ.**

Género: *Arca*, Linneo, 1758.

Arca lienosa, Say.

Hab.: Barra de Sta. Ana, Ver.

Arca noæ, Linn.

Hab.: Veracruz.

Arca helblingi, Brugière.

Hab.: Veracruz.

Arca incongrua, Say.

Hab.: Lag. de Términos, G. de México.

Lampsilis rovirosai, Pilsbry.

Sin.: *Unio (lampsilis) rovirosai*, Pilsbry.
Hab.: Laguna de Atasta, cerca de S. Juan Bau-
tista. Obra citada, p. 568.

Lampsilis saladoensis, Lea.

Sin.: *Unio saladoensis*, Lea.
Margaron (unio) saladoensis, Lea.
Hab.: Río Salado, Nuevo León. Obra citada,
p. 569.

Lampsilis umbrosus, Lea.

Sin.: *Unio tampicoensis*, var. *umbrosus*.
Unio umbrosus, Lea.
Margaron (unio) umbrosus, Lea.
Unio verarucensis, Lea.
Margaron (unio) veracrucensis, Lea.
Hab.: Río Salado, Río Medellín. B. C. A. Ch.
J. Simpson da por Habitat: Veracruz, p. 570.

Lampsilis berlandieri, Lea.

Sin.: *Unio berlandieri*, Lea.
Margaron (unio) berlandieri, Lea.
Hab.: Río Bravo (Matamoros). B. C. A. Obra
citada, p. 570.

Lampsilis tampicoensis, Lea.

Sin.: *Unio tampecoensis*, Lea.
Margarita (unio) tampecoensis, Lea.
Margaron (unio) tampecoensis, Lea.
Unio hermanni, Lea.
Margaron (unio) hermanni, Lea.

Hab.: Ríos Tampico, Moctezuma y Medellín.
B. C. A. y obra citada, p. 570.

Lampsilis tecumatensis, Lea.

Sin.: *Unio tecumatensis*, Lea.
Hab.: Río Tecumata, Méx., Río Cosamalopam. B. C. A. y obra citada, p. 571.

Lampsilis lividus, Simpson.

Sin.: *Unio testudineus*, Reeve.
Unio explicatus, F. et C.
Hab.: Río Usumacinta, cerca de Balancán.
Obra citada, p. 571.

Lampsilis alienigenus, C. et F.

Sin.: *Unio alienigenus*, C. et F.
Hab.: Coatzacoalcos, Ver. Obra citada, p. 572.

Lampsilis aztecorum, Philippi.

Sin.: *Unio aztecorum*, Philippi.
Margaron (unio) aztecorum, Lea.
Hab.: Río San Juan, Zimapam, Río Misantla.
Obra citada, p. 572.

Lampsilis metallicus, Say.

Sin.: *Unio metallicus*, Say.
Unio euprinus, Lea.
Margarita (unio) euprinus, Lea.
Margaron (unio) euprinus, Lea.
Unio aereus, Reeve.
Hab.: Lago de Chalco. Obra citada, p. 573.

Lampsilis scutulatus, Morelet.

Sin.: *Unio scutulatus*, Morelet.
Hab.: Yucatán. Obra citada, p. 576.

Lampsilis paludosus, Morelet.

Unio paludosus, Morelet.
Hab.: Yucatán, cerca de S. Gerónimo. Obrá
citada, p. 576.

Lampsilis planivalvis, Morelet.

Sin.: *Unio planivalvis*, Morelet.
Hab.: Río Usumacinta. Ch. J. Simpson. Nai-
ades, p. 576.

Lampsilis largillierti, Philippi.

Sin.: *Unio largillierti*, Phil.
Hab.: Yucatán. Ch. J. Simpson. Naiades, p.
577.

Gén.: *Nephronaias*, Crone et Fischer, 1893.

Nephronaias medellinus, Lea.

Etim.: Gr. νεφρός, riñón; Ναϊάς, Náyade.
Sin.: *Unio medellinus*, Lea.

Margarita (unio) medellina, Lea.

Margaron » » Lea.

» » *strebeli*, Lea.

Hab.: Veracruz, Río Medellín. Ch. T. Simp-
son. Naiades, p. 592.

Nephronaias sapotalensis, Lea.

Sin.: *Unio sapotalensis*, Lea.
Margaron (unio) sapotalensis, Lea.
Hab.: Río Sapotal (Ver.), cerca de Tlacotál-
pam. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 594.

Nephronaias tehuantepensis, C. et F.

Sin.: *Unio tehuantepensis*, C. et F.
Hab.: Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Ch. T.
Simpson. Naiades, p. 594.

Nephronaias æruginosus, Morelet.

Sin.: *Unio æruginosus*, Morelet.
Hab.: Río Michol y Palenque (Chiapas). Ch.
T. Simpson, p. 595.

Nephronaias rugulosus, Charpentier.

Sin.: *Unio rugulosus*, Charp.
Hab.: México..... Ch. T. Simpson. Naiades,
p. 596.

Nephronaias persulcatus, Lea.

Sin.: *Unio mexicanus*, Lea.
Unio persulcatus, Lea.
Unio caprinus, var. *C persulcatus*, Lea.

Margaron (unio) persulcatus, Lea.
Hab.: México, Palenque? Ch. T. Simpson.
Naiades, p. 596.

Nephronaias calamitarum, Lea.

Sin.: *Unio euprinus*, Lea.
Margaron (unio) calamitarum, Lea.
Hab.: México, Balentie, cerca de Palenque.
Ch. T. Simpson. Naiades, p. 596.

Nephronaias tabascoensis, Charpentier.

- Sin.: *Unio cuprinus*, var. *tabascoensis*, Lea.
Margaron (*unio*) *tabascoensis*, Lea.
Hab.: México, cerca de Palenque. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 596.
- Nephronaias plicatulus**, Charpentier.
Sin.: *Unio plicatulus*, Charp.
Hab.: México Ch. T. Simpson. Naiades, p. 597.
- Nephronaias melleus**, Lea.
Sin.: *Margaron* (*unio*) *melleus*, Lea.
Hab.: México Ch. T. Simpson. Naiades, p. 597.
- Género: *Plagiola*, Rafinerque, 1819.
- Plagiola cognata**, Lea.
Sin.: *Margaron* (*unio*) *cognatus*, Lea.
Hab.: Río Salado, N. L., Méx. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 606.

HOMOGENÆ.

Género: *Anodonta*, Lamark, 1799.

- Anodonta coarctata**, Anton.
Sin.: *Anodonta chapalensis*, C. et F.
Hab.: Lago de Chapala (Jal.). Ch. T. Simpson. Naiades, p. 630.
- Anodonta exilior**, Lea.
Sin.: *Anodonta chalcoensis*, C. et F.
Hab.: México. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 630.
- Anodonta dejuncta**, Lewis.
Sin.: *Anodonta mearnsiana*, Simpson.
Hab.: N. O. México. Ch. T. Simpson, p. 630.
- Anodonta imbecillis**, Say.
Sin.: *Margaron* (*anodonta*) *imbecillis*, Lea.
Anodonta incerta, Lea.
Anodon horda, Gould.
Anodonta hordeum, Pætel.
Hab.: SO. Matamoros. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 635.
- Anodonta heuryana**, Lea.
Hab.: NO. México. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 635.
- Anodonta globosa**, Lea.
Sin.: *Anodon nopalatensis*, Sowerby.
Margaron (*anodonta*) *nopalatensis*, Lea.
Hab.: México, Nopala? Ch. T. Simpson. Naiades, p. 646.
- Anodonta tabascoensis**, Morelet.
Hab.: Tabasco. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 646.
- Anodonta lurulenta**, Morelet.
Hab.: Yucatán. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 647.
- Gén.: *Unio*, Retzius, 1788.
- Unio coloratus**, Charpentier.
Etim.: *Unio*, unionis, la perla unión (Plinio).
Concha perlifera.
Hab.: Río Medellín (Ver.). Ch. T. Simpson. Naiades, p. 701.
- Unio callorus**, Lea.
Hab.: México. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 701.
- Unio mexicanus**, Philippi.
Sin.: *Margaron* (*unio*) *mexicanus*, Lea.
Hab.: México. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 701.
- Unio plexus**, Conrad.
Sin.: *Margarita* (*unio*) *carbonarius*, Lea.
» » *pliciferus*, Lea.
Hab.: Veraeruz, Río Jamapa. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 701.
- Unio crocodilarum**, Morelet.
Hab.: Río Usumacinta. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 702.
- Unio semigranosus**, V. den Busch.
Sin.: *Unio carbonarius*, var. *semigranosus*, Pötel.
Margaron (*unio*) *semigranosus*, Lea.
Hab.: Veracruz á Tampico, Río Pánuco, Tullijá. Ch. T. Simpson, p. 702.
- Unio corium**, Reeve.
Hab.: Chiapas.
- Unio testudineus**, Morelet.
Sin.: *Unio semigranosus*, Reeve.
Hab.: Río Usumacinta. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 702.
- Unio psoricus**, Morelet.
Hab.: Río Usumacinta. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 703.
- Unio discus**, Lea.
Sin.: *Unio panamensis*, v. dem Busch.
Unio mexicanus, Sowerby.
Hab.: Río Moctezuma. Ch. T. Simpson, p. 705.
- Unio pigerrimus**, C. et F.
Hab.: México. Ch. T. Simpson, p. 711.
- Unio mitchelli**, Simpson.
Hab.: Río Salado, Nuevo León. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 711.
- Unio sphenorhynchus**, F. et C.
Etim.: Gr. *σφῆν*, ós, cuña; *ρύγχος*, pico.
Unio acutirostris.
Hab.: México. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 712.
- Unio liebmani**, Philippi.
Hab.: México. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 712.
- Unio opacatus**, F. et C.

- Hab.: México. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 712.
Unio popeii, Lea.
 Hab.: NE. México, Rio Salado. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 738.
Unio poeyanus, Lea.
 Hab.: Rio de las Balsas, cerca de Coyuecan. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 738.
Unio tetralasmus, Say.
 Sin.: Marzarita (unio) tetralasmus, Lea.
Unio exultus, Conrad.
 » parallelus, Conrad.
 » symmetricus, Lea.
 » porrectus, Conrad.
 » suberoceus, Conrad.
 » jamaicanus, Lea.
 » tetralasmus, var. camptodon, Say.
 » » » manubius, Gould.
 » » » declivis, Say.
 » » » sayi, Ward.
 Hab.: Norte de México. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 741.
- Quadrula spheniopsis**, Morelet.
 Sin.: Unio spheniopsis, Morelet.
 Hab.: Río Usumacinta. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 794.
Quadrula ostreata, Morelet.
 Sin.: Unio ostreatus, Morelet.
 Hab.: Río Usumacinta. Ch. T. Simpson, p. 796.
Quadrula usumacintæ, C. et F.
 Sin.: Unio usumacintæ.
 Hab.: Ch. T. Simpson. Naiades, p. 796.
Quadrula guatemalensis, Simpson.
 Hab.: Río Usumacinta. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 796.
- Género: *Glabaris*, Gray, 1847.
- Glabaris strebeli**, Lea.
 Sin.: Anodonta strebeli, Lea.
 Margaron (anodonta) strebeli, Lea.
 Hab.: México Ch. T. Simpson. Naiades, p. 920.
- Glabaris cylindraceus**, Lea.
 Sin.: Anodonta inaequivalvis, Lea.
 » lenticularis, Lea.
 Anodon glaber, Sowerby.
 Anodon montezianus, Sowerby.
 Anodontia viridana, Clessin.
 Hab.: México. Ch. T. Simpson. Op. cit., p. 922.
- Glabaris grijalvæ**, Morelet.
 Sin.: Anodonta grijalva, Mor.
 Hab.: Tabasco, Méx. Ch. T. Simpson, o. c., p. 926.
- Glabaris glaucus**, var. *sinaloensis*, C. et F.
 Sin.: Anodonta glauca, Valenciennes.
 Hab.: Méx. Ch. T. Simpson, l. c., p. 926.
- Glabaris bambousearum**, Morelet.
 Sin.: Anodon bambousearum, Mor.
 Hab.: Palenque, Chiapas (Méx.). Ch. T. Simpson, l. c., p. 930.
- Glabaris tehuantepensis**.
 Sin.: Unio tehuantepensis.
 Hab.: Santa Efigenia, Istmo de Tehuantepec. B. C. A., p. 501.

TETRAGENÆ.

Género: *Quadrula*, Rafinesque, 1820.

- Quadrula digitata**, Morelet.
 Sin.: Unio digitatus, Morelet.
 Hab.: Río Usumacinta, Río Sabinos. Ch. T. Simpson, p. 770.
- Quadrula nickliniana**, Lea.
 Sin.: Unio nicklinianus, Lea.
 Margarita (unio) nicklinianus, Lea.
 Margaron (unio) nicklinianus, Lea.
 Plectomerus nicklinianus, Conrad.
 Hab.: Rio Moctezuma. Ch. T. Simpson, p. 771.

- Quadrula heros**, Say.
 Sin.: Unio heros.
 Unio heros, var. *multiplicatus*, Pötel.
 » undulatus, Say.
 » multiplicatus, Lea.
 » eightsi, Lea.
 » atrocostatus, Reeve.
 Hab.: Nuevo León. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 770.

- Quadrula stolli**, von Mart.
 Sin.: Unio stolli.
 Hab.: Río de las Sabinas y Río Moctezuma. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 771.

- Quadrula conchiana**, Lea.
 Sin.: Unio conchianus, Lea.
 Margaron (unio) conchianus, Lea.
 Hab.: Rio Salado. Ch. T. Simpson. Naiades, p. 771.

CARDITIDÆ.

- Género: *Cardita*, Brugière, 1789.
Cardita pectunculus, Brugière.
 Hab.: Golfo de California.

SUBORDEN VII. CARDIACÆ.

TRIDACNIDÆ.

Gén.: *Hippopus*, Lam., 1799.

- Hippopus equinus**, Menke.
Etim.: Gr. *ἵππος*, caballo; *πούς*, pie; latín *equus*, caballo.
Hab.: Laguna de Términos.
- Dosinia annæ**, Carpenter, 1857.
Hab.: Mazatlán, Golfo de California.
Género: *Venus*.

CARDIIDÆ.

- Gén.: *Cardium*, Lin., 1758.
- Cardium proserum**, Sowerby.
Hab.:
- Cardium consors**, Broderip.
Etim.: Latín *consors*, compañero.
Hab.: Golfo de Cal. y Ver.
- Cardium magnum**, Bom.
Hab.: Playa de Ver. y Campeche.
Subgénero: *Lævicardium*.
- Lævicardium elatum**, Sowerby.
Hab.: Playa de Mulegé.
- Lævicardium citrinum**, Chemnitz.
Hab.: Veracruz (Golfo de México).

SUBORDEN VIII. CHAMACEA.**CHAMIDA.**

- Género: *Chama*.
- Chama arcinella**, Linneo.
Hab.: Veracruz, Barra de Sta. Ana.
- Chama macrophila**, Chemnitz.
Hab.: Veracruz.
- Chama congregata**, Conrad.
Hab.: Hatteras á Yucatán.

SUBORDEN IX. CONCHACEAS.**VENERIDÆ.**

- Gén.: *Dosinia*.
- Dosinia discus**, Reeve.
Hab.: Veracruz.
- Dosinia elegans**, Conrad.
Hab.: Yucatán.
- Dosinia ponderosa**, Gray, 1838.
Sin.: *Arthemis ponderosa*, Gray, 1838.
» *gigantea*, Sowerby.
- Venus cycloides**, Orbigny.
Arthemis distans, Sow.
Hab.: Costa occidental de la República Mexicana.
- Dosinia dunkeri**, Philippi, 1844.
Sin.: *Dosinia simplex*, Hanley.
Cytherea pacifica, Troschel, 1845.
Venus pacifica, Dillwyre, 1817.

- Hab.: Golfo de Cal., Baja Cal., Mazatlán.
- Dosinia annæ**, Carpenter, 1857.
Hab.: Mazatlán, Golfo de California.
Género: *Venus*.
- Venus mercenaria**, Lin.
Hab.: Yucatán.
- Venus (trigonia) argentina**, Sowerby.
Hab.: Golfo de California á Panamá.
- Venus (trigonia) planulata**, Sowerby.
Hab.: Golfo de California á Panamá.
- Venus (chione) fluctifraga**, Saul.
Hab.: Golfo de California.
- Venus (trigonia) radiata**, Sowerby.
Hab.: Golfo de California á Panamá.
- Venus intrapurpurea**, Conrad.
Hab.: Playa de Veracruz.
- Venus campechensis**, Gmelin.
Sin.: *Venus calcarea*, Philippi.
» *tenuilamellata*, Sowerby.
» *fulgorans*, Tryon.
» *mortonii*, Conrad.

- Venus campechensis**, var. *alboradiata*, Sow.
» » » *quadrata*, Dall.
» » » *tetisca*, Conrad.
» » » *cuneata*, Conrad.

Hab.: Yucatán.

Gén.: *Clementia*.

- Clementia solida**, Dall., 1902.

Hab.: Topolobampo, Costa occidental de México.

Subgénero: *Chione*.

- Chione cancellata**, Lin.

Hab.: Veracruz (G. de Méx.).

- Chione (timoclea) grus**, Holmes.

Hab.: Yucatán.

Género: *Callista*, Poli, 1791.

- Callista lulanaria**, Lesson.

Sin.: *Cytherea (dione) lulanaria*, Desh.

Habitat: G. de Cal., Mazatlán.

- Callista rosea**, Broderip.

Hab.: G. de Cal.

CYRENIDÆ.

- Género: *Sphaerium*.
- Sphaerium triangulare**, Prime.
Sin.: *Cidas triangularis*.
Hab.: México. B. C. A., p. 551.
- Sphaerium subtransversum**, Prime.
Hab.: Ciudad de México, Jalapa, Tabasco. B. C. A., p. 551.
- Sphaerium martensi**, Pilsbry.
Hab.: Tzintzuntzan, Lago de Pátzcuaro. B. C. A., p. 552.

Sphaerium luridum, sp. n. Martens.

Hab.: Méx., Ameca (Jal.). B. C. A., p. 552.

Sphaerium yucatanense, C. et F.Sin.: *Eupera maculata*, Martens.*Sphaerium maculatum*, Adams.*Cidas maculata*, Morelet.*Limoscina maculata*, Clessin.

Hab.: Yucatán. B. C. A., p. 553.

Siphærium sulcatum.

Hab.:

Género: *Cyrena*.(Gén.: *Polymesoda*. B. C. A.).**Polymesoda olivacea**, Martens.Sin.: *Cyrena olivacea*, Carp.» *fontainei*, Philippi.

Hab.: Mazatlán, La Paz (B. Cal.). B. C. A., p. 541.

Polymesoda triangula, Martens.Sin.: *Cyrena triangula*, Bush.» *altilis*, A. Gould.» *mexicana*, var. *altilis*, Gould.

Hab.: Mazatlán. B. C. A., p. 546.

Polymesoda cordata, Martens.Sin.: *Cyrena cordata*, Wiegmann.

Hab.: Veracruz, Jalapa, México, Monterrey. B. C. A., p. 546.

Polymesoda germana, Martens.Sin.: *Cyrena germana*, Prime.

Hab.: Río Pánuco, cerca de Tampico. B. C. A., p. 547.

Polymesoda mexicana, Martens.Sin.: *Cyrena mexicana*, Broderip.

Hab.: La Paz (B. Cal.). B. C. A., p. 548.

Gén.: *Neocorbicula*, Fischer, 1887.**Neocorbicula convexa**, Martens.Sin.: *Corbicula convexa*, Deshayes.» *ventricosa*, Prime.

Hab.: Mazatlán, Acapulco. B. C. A., p. 550.

Gén.: *Pisidium*.**Pisidium singleyi**, Mart.

Hab.: Itztlán Creek, Guadalajara. B. C. A.

Pisidium compressum.

Hab.:

Pisidium abditum, Hald.

Hab.: Texolo (Ver.).

RANGIIDÆ.Gén.: *Gnathodon*, Gray.Sinonimia: *Rangia*.**Gnathodon cuneatus**, Gray.G. *cuneata*, Conrad.

Hab.: Veraeruz, G. de Méx.

DONACIDÆ.Gén.: *Donax*, Linneo, 1758.**Donax rostratum**, Ad.

Hab.: Barra de Ocós.

Donax denticulatus, Linneo.

Hab.: México.

Gén.: *Iphigenia*, Schumacher, 1817.**Iphigenia brasiliensis**, Lamark.

Etim.: Iphigenia hija de Agamenón.

Hab.: Veracruz.

PSAMMOBIIDÆ.

Etim.: Gr. φάμυος, arena; βίω, yo vivo.

Gén.: *Sanguinolaria*.**Sanguinolaria miniata**, Gould.

Hab.: Barra de Ocós.

Gén.: *Psammobia*.**Psammobia**.

Hab.: G. de Cortés.

SOLENIDÆ.Gén.: *Solenocurtus*.Subgén.: *Tagelus*.**Tagelus gibbus**, Spengler.

Hab.: Veracruz.

Gén.: *Ensis*, Schumacher, 1817.Sinonimia: *Ensatella*, Swainson, 1840.**Ensatella americana**, Verrill.

Hab.: G. de Cal.?

SUBORDEN X. MYACEA.**MACTRIDÆ.**Gén.: *Mactra*, Linneo, 1767.**Mactra alata**, Spengler.

Hab.:

Mactra donaciformis, Adams.

Hab.: Barra de Ocós.

Mactra exoleta, Gray.

Hab.:

Gén.: *Racta*.**Racta elegans**, Sowerby.

Hab.: Barra de Ocós y G. de Cal.

SUBORDEN XI. ADESMACEA.

PHOLADIDÆ.

Gén.: *Pholas*, Lister, 1687.**Pholas dactylus.**

Etim.: Gr. φωλάς nombre de una concha (Atheneo).

Hab.: Términos, Campeche, G. de México.

Pholas crucigera, Sowerby.

Hab.: G. de México, Alvarado.

Pholas costata, Linneo.

Hab.: G. de México, Alvarado.

Gén.: *Martesia*.**Martesia cuneiformis**, Say.

Hab.: Veracruz.

ORDEN: DIBRANCHIA.

SUBORDEN J. LUCINACEA.

LUCINIDÆ.

Gén.: *Lucina*, Brugière, 1792.

Etim.: Nombre mitológico. La casta Lucina.

Lucina eburnea, Reeve.

Hab.: G. de California.

Lucina costata, F. et H.

Hab.: Hatteras á Yucatán.

Lucina chrysostoma, Dunker.

Lucina boca de oro. Gr. χρύσος, oro; στόμα, boca.

Hab.: Veracruz (G. de Méx.).

Lucina sagrinata, Dall.

G. de Méx. á Yucatán.

Lucina tigerina, Linneo.

Hab.: Veracruz (G. de Méx.).

SUBORDEN II. TELLINACEA.

TELLINIDÆ.

Gén.: *Tellina*, Linneo, 1758.**Tellina purpurea**.

Hab.:

Tellina punicea.

Hab.:

Subgén.: *Arcopagia*, Leach, 1827.**Arcopagia fausta**.

Hab.:

Gén.: Gastrana, Schumacher, 1817.

Subgén.: *Capsa*, Brugière, 1791.**Capsa deflorata**, Broderip.

Hab.: Veracruz.

SCROBICULARIDÆ.

Gén.: *Semele*, Schumacher, 1817.**Semele proxima**.

Etim.: Nombre mitológico, Σεμέλη, madre de Baco.

Hab.: Veracruz.

Semele variegata.

Hab.:

Dr. Jesús Díaz de León.