


EL TLALCOYOTL,

POR EL SEÑOR DON ALFREDO DUGES,

SOCIO CORRESPONSAL EN GUANAJUATO.

El mamífero carnívoros, designado por Hernandez con este nombre, es evidentemente la *Taxidea Berlandierii*, de Baird, conocido con el nombre de Puerco Jun, y también con el de Tejon.

Su descripción, en vista de una hembra joven, la única que he examinado, es como sigue:



Dimensiones: cabeza 0,^m 15; cuerpo 0,^m 32; cola 0,^m 13; ancho del dorso 0,^m 20. Fórmula dentaria i. $\frac{3}{3}$, c $\frac{1}{1}$, m $\frac{4}{4}$

Pelo muy largo sobre el cuerpo, menor en la cola y corto en el hocico; partes superiores de un gris leonado; laterales leonado claro con rayas negruzcas. Detras de la nariz nace una línea blanca que sube á la frente y llega hasta la nuca; en los dos tercios posteriores de la parte média del dorso existe la misma. Nariz y lados del hocico pardos, así como una faja entre la línea blanca de la frente y el carrillo; éste es blanco, y sobre los lados de la quijada hay una extensa mancha triangular negra; orejas negras, ribeteadas de blanco en su borde libre. Iris negruzco. Cola rojiza con la punta casi negra. Patas de este color con las uñas pardas.



Este animal, que es la primera vez que lo veo, en 17 años que llevo de permanencia en Guanajuato, me dicen que se encuentra por el rumbo de Silao, y que de noche sale de sus madrigueras, á asolar los plantíos de maíz; mas por lo que he observado prefiere la carne á los demas alimentos.

Setiembre de 1870.

El género *Meles*, de Linneo, designado despues por Cuvier con el de *Taxus*, pertenece á la sub-familia de los Carnivoros plantigrados de este autor y a

la division sub-ursianos de Blainville. Está caracterizado por tener 36 dientes, 6 incisivos y 2 caninos en ambas mandibulas, 8 molares en la superior y 12 en la inferior. Son animales de cuerpo rollizo y bajo por la cortedad de sus piernas, que los hace andar casi arrastrándose; su hocico es recogido y las orejas cortas, arredondadas y casi ocultas por el pelo; ojos pequeños; lengua lisa, piernas terminadas por 5 dedos armados de uñas largas y robustas, sobre todo las anteriores, las que son propias para escarbar la tierra; cola corta y velluda, y junto al ano se encuentra una bolsa provista de un orificio transversal, siendo el producto de la secrecion de un olor repugnante; mamas en número de seis, 2 pectorales y 4 ventrales; pelo largo, grasoso, rudo al tacto, y de tres colores y nada escaso.

El género de que nos ocupamos ha sido dividido por los metodistas modernos: 1.º, en *Taxus* propiamente, que comprende el Tejon de Europa, Blaireau de los franceses, *T. vulgaris*, Lin.; 2.º, *Taxidea*, á la que corresponde el *T. Labradorica*, y nuestra especie; *Ursitaxus*, reservada al *U. Nappaulensis*, de las Indias Orientales.

Estas secciones fundadas en las distintas regiones que habitan las especies y en algunas diferencias en la denticion, son consideradas por Chenu como simples sub-géneros y no géneros como así las admiten algunos.

Como el Tejon de Europa, el Tlalcoyote es un animal perezoso; la forma de su cuerpo, la cortedad de sus patas y fuerza de sus uñas, le permiten escarbar con facilidad la tierra é internarse en ella á través de una madriguera tortuosa y oblicua; no sale sino durante la noche para alimentarse, siendo muy duro de matar y valeroso cuando se ve atacado.

Esta especie habita, segun noticias, exclusivamente en la mesa central de México, en los terrenos pedregosos de la falda de las montañas que están inmediatos á los plantíos de maiz, pues se alimentan siempre que pueden, con las raíces de esta planta, devorando tambien el *elote* cuando está tierno. En el Valle de México se les encuentra raras veces.

El único ejemplar de la *T. Berlandierii* que existe en las colecciones del Museo Nacional, es una hembra bastante jóven; mide de largo 65 centímetros y de ancho en el dorso 25; su cola, en lo general, es tal como la describe el Sr. Dugés, notándose sin embargo, que la línea blanca que nace de la extremidad del hocico, se extiende hasta el nacimiento de la cola, con una ligera interrupcion en la mitad del dorso; las manchas negruzcas, más bien que rayas, de la parte superior y lateral del cuerpo, son muy extensas; la parte inferior es blanco-amarillenta; el pelo del dorso y flancos examinado aisladamente, es de este color en su primera mitad, en seguida negro, y blanco cerca de la punta. Los dientes anteriores que son los únicos que

se pueden estudiar en el ejemplar citado, presentan los caracteres que F. Cuvier describe en los animales del género *Taxus*; incisivos, dispuestos transversalmente, con los externos superiores más gruesos que los demas y en forma de caninos, los inferiores correspondientes algo ensanchados en paleta y desigualmente bilobulados; caninos robustos, poco largos, cónicos, bastante arqueados, sobre todo los inferiores que son más ganchudos y ménos carenados que los superiores. (C. de P.)

NOTA.—El pelo no está representado en el grabado tal como debe ser, pues es mucho más largo y lacio.
