



ORNITOLOGÍA.

SOBRE TRES ESPECIES NUEVAS DEL GÉNERO "TETRAO"

POR EL SEÑOR DON PABLO DE LA LLAVE.

El género *perdiz* es muy abundante en nuestro país; de solo los contornos de México conozco cinco especies, pero únicamente hablaré de tres que he tenido ocasion de observar, por haber mantenido en mi casa muchos individuos, algunos por más de un año y visitándolos con frecuencia.

La primera es del tamaño de una polla grande, el pico pequeño y muy robusto, de color de coral lo mismo que los piés, que carecen de espolon. Tienen desnudo el ámbito del ojo y del mismo color encendido. La cola es larga, un poco levantada sobre la línea horizontal, plana, con las rectrices iguales. Esta circunstancia me da á entender que pudiera cómodamente separarse del género *tetrao*. En otra vez discurrirémos sobre ello, y por ahora la reducirémos al referido género. La barba es negra, las plumas de la cabeza algo erizadas, las del pecho cenizas con el centro achocolatado. El dorso, cola y remos marmolado de blanquizeo y negro.

El idioma de estas aves es muy variado y agradable, ménos una entonacion peuliar al macho y que le he oído muchas mañanas al tiempo de abrir la ventana por donde les entraba la luz: es un golpeo ó aullido ronco y desagradable, que va subiendo por pun-

tos, y en llegando á cierto término va bajando del mismo modo. El alimento con que se han mantenido ésta y las demás especies, es el maíz pequeño que llaman de pichones, y las lechugas, que todas comen con mucho gusto. Una sola ocasion he visto que una hembra se atravesase al macho, echándose como para excitarlo á que la cubriese; accion que éste vió con la mayor indiferencia; pero todas las mañanas al tiempo de echarles el grano manifestaba la galantería propia del sexo, llamándolas sin cesar para que viniesen á comer, y el movimiento con que lo hacia no era el más gracioso, pues era empinándose, abriendo las alas y esponjando toda la pluma, aunque la voz era dulce y graciosa.

La segunda especie es incomparablemente más pequeña que ésta, tiene en la cabeza una cresta de plumas muy erguida y delgada; el pico negro, la cola medianita, el cuerpo longano muy levantado, el pié trasero robusto y pequeño de color gris ó negruzco, y más que de *tetrao*, tiene el aire de las *alondras* ó *terreras*. Casi toda es aplomada, con las plumas del pecho ribeteadas de negro, y las de los hipocondrios con manchas longitudinales blancas. Su idioma es tambien muy variado, y el macho tiene un castañeteo fuerte, subiendo y bajando la cabeza. No le he advertido ninguna galantería; es animal desconfiadísimo, todos sus movimientos bruscos, y á pesar del mucho tiempo que les he estado dando de comer, cada día estan más broncas y ariscas.

La tercera especie há pocos días que me la han traído; es un poco más pequeña que la anterior, y su porte enteramente distinto. Éstas meten la cabecita en los hombros, son casi redondas, la colita pequeñísima y caída, y en todo están anunciando una dulzura, y por decirlo así, una bondad de carácter que probablemente no se encontrará en ninguna especie de este género. Son naturalmente mansas y domésticas, en términos de dejarse coger con la mano: están siempre juntitas formando una parvita; en cuanto alguna se separa las demás la van siguiendo; no gustan, como las otras, de dormir en alto, sino en el suelo y muy arrimaditas para abrigarse; y su lenguaje, que no deja de ser variado, es muy bajo y pianito; nunca he oído expresion fuerte al macho. En las otras dos especies éste se distingue de la hembra solo en el tamaño, siendo el color y pinta la misma, pero en esta última especie el macho tiene en la cabeza y sus lados unas listas blancas, que se cruzan y parecen una toquita.¹ Aunque manifiestan mucha ligereza y velocidad cuando se asustan, por lo demás su andar y movimientos son habitualmente lentos y pausados, trayendo la pluma como esponjada. Tienen el piquito negro muy recogido, con su base azul, y algo azulados los piés, que son pequeños, sin espolon, pero con grandes uñas corvas. El ropaje no deja de ser vistoso: el centro de la parte inferior es de un castaño subido y lo demás negro con gotas blancas que á veces forman bandas: la braga y muslos negros, y por el dorso tienen las plumas largas, con una raya blanquizca ó achocolatada en la mayor parte del eje de la pluma, y el resto atravesado alternativamente con fajitas negras y bayas ó achocolatadas. En esto convienen todas, pues por lo demás he advertido diferencias especialmente en la parte inferior. Por las siguientes descripciones se formará una idea más cumplida de estas aves.

¹ Esta especie necesita de nuevas observaciones, pues hemos visto que en algunos individuos, que reputábamos hembras, han aparecido despues las fajas y manchas blancas ó la *toca*.

TETRAO MARMORATA.

Cristata, variis pica coloribus, rostro pedibusque corallinis.

Rostrum breve, robustum intense corallinum, mandibulis levibus, paululum undulatis, superiore adunca, lateribus compressa.

Caput plumis cristatum suberectis, nigrescentibus, apice testaceis; barba, collo genisque nigris, hinc lineolis albidis quatuor intersectis, oculorum ambitu nudo etiam corallino, iride pallide virescenti.

Collum, pectus, totaque subtus variegata plumulis cinereis centro rufescentibus.

Remiges primores, fusco-nigrescentes, reliqui fasciis ex albido nigroque marmorati.

Cauda rectricibus 12 apice latioribus; centrales omni ex parte uti remiges marmorato-fasciati, laterales altera tantum medietate, de cætero nigrescentes, pedibus ealcaratis rostro concoloribus.

Corpus ab vropigio ad rostri basim 12 pollicare. Cauda 6 pollices longa, plana, horizontalis.

Habitat regionibus callidis ad Mexici meridiem. Vidi individuum captum nivoso Popocatepec, totum cinereum.

TETRAO CRISTATA.

Plus minisve cinerea, pectoris plumulis nigro marginatis, crista erecta.

Rostrum breve nigrum, naribus tuberculatis, supra cinerea aut cinereo fusca, crista frontali concolori erecta, apice quasi penicillata et albida. Subtus collo pectoroque plumis vestita cinereis, margine nigris, abdomine et crisso rufescentibus margine fusco, hipocondriis maculis albis longitudinalibus notatis. Rectrices 14 cinereo fuscae remigibus concoloribus. Pedes fusco virescentes aut grisei ealcarati. Magnitudo corporis 8 pollicaris.

Habitat ad *Mezquital* septentrionali Mexici plaga. Subtus in pectore præsertim, plumarum centro macula triangularis animadvertitur rufidula.

TETRAO GUTTATA.

Subtus, albo nigroque variegata, supra plumis vestita longis, rachide rufescenti, de cætero albido rufescenti nigroque transversim fasciatis.

Rostro robusto, brevi, nigro, basi cerulescenti, mandibula superiori adunca. Caput rufo et nigro variegatum, nuca rufa, suberistata. Barba nigra, collari albo cincta, oculorum regione concolori vestita mandibula inferiori ad latera macula etiam alba notata. Supra, variegata plumulis rachide rufescentibus, de cætero nigro et rufo fasciatis et marmoratis: Subtus, centro intense castaneo, lateribus nigris albo guttatis, abdomine, crisso femoribusque nigris. Remiges fusci rufo fasciati, tectribus nigro guttatis. Pedes cerulescentes unguibus magnis arcuatis. Cauda brevissima deflexa. Corpus 5. . . 6 pollicare.

Habitat regione callida meridionali, Mexicum versus.

Fœmina mari æqualis, collari exopto maculisque albis oculorum. ¹

¹ Véase la nota anterior.

(Del *Registro Trimestre*. México, Diciembre 2 de 1831.)